D bis / b / m. r.

CIVICA
F. Ant.
BIBLIOTECA BERIO

BIBLIOTECA CIVICA BERIO GENOVA

BERIO

D bis / 12 / 4 / 16
m. r.
V
3
, 26

CIVICA
BIBLIOTECA BERIO
F. Ant.
m. r.
V
3
26
GENOVA

BIBLIOTECA CIVICA BERIO
GENOVA

Non gatti



BOTANOTHECA LIGURE

IMAGINI

DISEGNATE

DA

G. L.

Volme Secondo

[A] Antirrhinum Cymbalaria Linn. sp. 851. Willd. sp. 3. p. 232. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 64.
A. glabrum, caulibus procumbentibus, foliis alternis petiolatis cordatis quinquelobis, floribus axillaribus solitariis pedunculatis Poll. fl. veron. t. 2. p. 331. ... Antirrino Cimbalaria. ..... Cymbalaria Matth. p. 1182.

Linaria Cymbalaria Willd. enum. p. 639. Decand. syn. pl. n. 2634.

Flores violacei, palato flavo, interdum albi. Ab aprili in autumnum propre la porta Romana. ♃.

[B]. Asplenium Trichomanes Linn. sp. 1540. All. fl. Ped. t. 2. p. 284. Decand. syn. pl. n. 1410.
A. foliis confertis patentibus pinnatis, pinnis ovato-subrotundis crenulatis, petiolo atropurpureo glaberrimo subcanaliculato, lineis fructificantibus 6-8. obliquis subovatis. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 705. .... Trichomane Matth. p. 1261. . Morand. tab. IV. f. 4.
Floret toto fere anno
In saxosis umbrosis et muris antiquis vulgatissim. ♃.

[C] Parietaria officinalis Linn. sp. 1492.
P. caule erectiusculo ramoso, foliis petiolatis elliptico-lanceolatis utrinque attenuatis basi uninervibus, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 692.
Flores herbacei; aprili, maio.
In ruderatis et muris vulgatissim. ♃.

[D] Hedera Helix Linn. sp. 292.
H. foliis quinqueangularibus quinquelobisque, floriferis ovatis umbella erecta Will. sp. 1. p. 1179.
Flores subflavi; septembri, octobri.
In rupibus veteribusque muris et saepissime in arboribus. ♄.

tutte di Nessun effetto

BIBLIOTECA CIVICA BERIO GENOVA

Spartium spinosum Linn. sp. 997.

S. foliis ternatis ~~obvatis~~ obovatis, pedunculis axillaribus, calycibus leguminibusque glabris, ramis angulatis spinosis.

Flor. maio.

Genuae in collibus al Lagaccio, et supra Oregina et Marassi; copiose in montibus inter Framura et Levanto. ♄.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

Cistus Salvifolius Linn. sp. 738. Willd. sp. 2. p. 1184. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 101.

C. frutescens exstipulatus, foliis oppositis petiolatis ovatis obtusis rugosis subcrenulatis, supra hirsutis pilis stellatis, subtus tomentosis, pedunculis longissimis unifloris. Vell. Fl. Ver. t. 2. p. 180. .. Cisto Salvifolio..

Petala alba, basi luteola. Maj. Jun.

Genuae in collibus al Garbo, Marassi. Lagazzo. E. ♄.

B Orchis bifolia Linn. sp. 1331.

O. foliis radicalibus ovato-oblongis subbinis, caulinis lanceolato-linearibus brevissimis, labello lineari integerrimo cornu germine duplo longiore.

Flor. maio, junio.

Habitat in collibus al Garbo prope Granarolo. 4.

cattivo esemplare

F 1. Briza maxima Linn. sp. 103.

B. spiculis cordatis flosculis septendecim.

Gramen tremulum maximum. Scheuchz. agrost. 202, t. 4, f. 7.

Maio, junio floret.

Genuæ in collibus al Lagazzo, et secus aqueduct. ☉

F 2.

Genuæ all'acquasola maj.

Bromus distachyos Linn.

Flor. maio.
Habitat. prope sepulcretum alla Foce locis saxosis, et in collibus circa Marassi. ♃

Bromus distachyos? Linn.

Bupleurum falcatum Linn. sp. 241.

B. involucellis pentaphyllis acutis, universali subtriphyllo inequali, foliis radicalibus ovatis longè petiolatis, cæteris oblongo-lanceolatis, caule flexuoso.

Flores lutei; junio, julio, augusto.

In locis siccis et petrosis. Genuæ in collibus extra portam dello Zerbino. ♃.

Phyteuma orbicularis Linn. sp. 242.

P. capitulo subrotundo, foliis serratis, radicalibus cordatis.

Rapunculus corniculatus caeruleus minor. Barr. Ic. 525.

Flore. junio ad augustum

In collibus prope ~~[illegible]~~ duos pontes S. Pantaleone, et S. Tecla 4. Camaldoli

…egno
non buona

β Orchis bifolia sp. 1331.

O. foliis radicalibus ovato-oblongis subbinis, caulinis lanceolato linearibus brevissimis, labello lineari integerrimo cornu germine duplo longiore.

Floret. maio, junio

Habitat in collibus prope St. Tecla 4. Flores odori.

Rhinanthus crista galli Linn. sp. 840.

R. Caule erecto subsimplici glaberrimo, foliis sessilibus oppositis lanceolato-oblongis dentatis, floribus axillaribus subspicatis, calycibus hirsutis.

Alectorolophus glaber All. Fl. Ped. n. 206.

Flor. maio, junio.

In collibus Marassi. Camaldoli, et prope S.t Tecla ☉

Obs. variat. auriculis integris aut 2-fid. Calyce constanter hirsuto.

B

~~Cnicus tuberosus Roth. Germ. I. p. 345.~~
~~C. foliis amplexicaulibus pinnatifidis ciliato-spinosis, laciniis bilobis basi sursum dentatis,~~
~~caule subbifloro, calycinis squamis lanceolatis mucronatis patulis Willd. sp. 3. p. 1680.~~
~~Carduus tuberosus Lin. sp. 1154. var. β Cirsium tuberosum. All. Fl. Ped. n. 551.~~
~~Acanthus sylvestris alter. Dalech. Hist. 1444.~~

Flor. junio
Habitat. in montibus ai Camaldoli. 4.

obs. Calyx imbricatus ventricosus, squamis spinosis. pappus et Receptaculum ~~pilosum~~ setosum

Centaurea Scabiosa.

~~Cnicus [illegible] ? [illegible]~~
Cnicus tuberosus ? Carduus. Linn

B

Linum viscosum Linn. sp. 398. Bert. pl. Gen. 47

L. caule recto, foliis lanceolatis tri-quinque nerviisve subpubescentibus calycibusque acuminatis margine ciliato-glandulosis, ramis floriferis subdichotomis, floribus pedunculatis secundis = Flor. junio

Genuæ copiosè circum lo Sperone. Bertoloni. prope ai Camaldoli, e S.t Tecla 4.

B

A

13

A Orobanche Caerulea Vill. Dauph. 2, p. 406.

O caule subsimplici, corollis quinquefidis, bracteis ternis, calycibus tubulatis semiquadrifidis.

O. laevis Linn sp. 881. ... O purpurea Jacq. fl. austr. t. 276.

Flor. junio.

Habitat in pascuis, agrorum marginibus, et collibus prope Marassi; S.t Bernardini. O.54

B Orobanche minor. Lois. fl. Gall. p. 385.

Flores Maj. Junio. prope le fortezze di S. Giuliano. locis umidius.
super Hedera helix

F. 2.

F. 1

B

Sedum ~~annuum~~ Dasyphyllum L. Linn. sp. 620.

S. caule erecto solitario annuo, foliis ovatis sessilibus gibbis alternis, cyma recurva.

Flore. junio julio.

Habitat in veteribus muris. ☉

Obs. differt a S. acri rad. annua; caule erecto. Cyma propria nulla, sed rami florent. recurvati.

~~F. I. Sedum acre~~ Linn. sp. 619.

Sedum Dasyphyllum Linn. sp. 618. f. 1. et f. 2.

In veteribus muris Genuae

B

Anagallis Phœnicea Lam. Fl. Fran. 2, p. 285.

A. caule procumbente, foliis ovato-lanceolatis, calycis segmentis lanceolatis. Hall.

A. arvensis Linn. sp. 211.

Flores rubri, aliquando albi; aestate

In arvis et cultis vulgatissima ☉

2

B

f. 1 Dianthus prolifer Linn. sp. 587. Willd. sp. 2. p. 673. Allion. Fl. Ped t. 2. f. 75.
D. foliis linearibus margine scabris, floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis muticis scariosis tubum superantibus. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 40. .. Garofano prolifero...

Flor. junio, julio. dilute purpurei.

In moeniis ~~prope~~ sub portam Romana. ⊙ et ad acquapenh. fl. april.

f. 2. Dianthus carthusianorum

Dianthus prolifer?

Corollis ecaudatis

Antirrhinum majus Linn. sp. 859.

A. Caule erecto, foliis lanceolatis oppositis alternisve, floribus racemosis, corollis ecaudatis....

.. variat foliis latioribus et foliis angustioribus.

Flores albi vel purpurei, colore dilutiore aut saturatiore, rictu aureo; majo, junio.

In rupibus veteribusque muris; reperit. ad portam Romana. 4. in bisagno.

13 Panicum dactylon Linn. sp. 85.

P. spicis digitatis patentibus, basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus. Linn.

Digitaria dactylon. all. fl. Ped. n. 2170.

Floret junio, julio, augusto.

In pascuis et agris. vulgatissimum ♃.

Obs. Iure merito Cl. Hall. ex hac planta, sicuti ex consimilibus spicis digitatis, Digitariæ genus constituit, propt. defectum tertiæ glumæ calycinæ.

Campanula Erinus. Linn. Sp. 240. Will. Sp. 1. p. 917. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 114. Bib. Fl. Ver. t. 1. p. 283.

C. Caule dichotomo, foliis sessilibus, superioribus oppositis tridentatis. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 124. 33.

Flores ceruliscent. junio julio.

Genuae ~~sub~~ moeniis ad Portam. Romana et Pila. ☉

Campanula erinus? Linn

B

Caule volubili.

Convolvulus arvensis Linn. sp. 218.

C. foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis subunifloris.

Flores dilute purpurei, interdum prorsus albi; aestate.

In arvis inter segetes, in vinetis; ad portam Pila vulgatissimus. 4.

Cineraria maritima Linn. sp. 1244.

C. Caule ramoso tomentoso basi suffrutescente, foliis pinnatifidis tomentosis, laciniis obtusis subtrilobis, floribus corymboso-paniculatis, calycibus tomentosis.

Floret junio, Julio.

Genuæ in moeniis sub la Lanterna; totius Liguriæ incola, locis humilioribus ad mare. ♃

Sedum rupestre Linn. sp. 618. Willd. sp. 2. p. 764. All. fl. Ped. Tom. 2. p. 120.

1. S. foliis subulatis erectis quinquefariam confertis basi solutis, floribus subcymosis... ... Poll. fl. veron. t. 2. p. 69.

Obs. Folia omnia erecta nec reflexa. Paniculae subcymosae ramuli erectiusculis aut vix reflexi. Flores aurei, interdum hexapetali, calycibus obtusiusculis. Jun. Juli.

~~Flor. Junio, Julio.~~

In rupibus, veteribusque muris, Genuae. reperitur. ad portam S. Bartolomei.

Sedum

13

Reseda lutea Linn. sp. 645.

R. Caule ramosa, foliis pinnatifidis, superioribus subtrilobis, floribus racemosis, racemis terminalibus

Flor. aestivis mensibus

In locis siccis sterilibus: prope lo Zerbino vulgatissima ♃.

Reseda undata Linn. sp. 644. /

Psoralea bituminosa Linn. sp. 1075.

P. caule erecto ramoso, foliis ternatis petiolatis, foliolis ovato-lanceolatis, floribus capitatis pedunculatis axillaribus.

Flor. julio, augusto.

In locis siccis vulgatissima 4.

Ononis viscosa Linn. sp. 1009.

O. Pedunculis unifloris aristatis, aristis filiformibus flore longioribus, foliis infimis ternatis, foliolis ovato-oblongis serratis viscosis, superioribus simplicibus

Flores pallidi lutei, vexillo venulis purpurascentibus lineato. junio, julio.

Habitat prope portam divi Bartolomei, et in alveo del Bisagno. ☉

Ononis natrix Linn.

Holchus lanatus Linn. sp. 1485.

Flor. majo, junio
Genuae in canalibus propes aqueductum dello Zerbino

Poa aquatica

27

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

~~Panicum viride Linn. sp. 83. All. fl. Ped. t. 2. f. Lois. fl. Gall. t. 1. p. 38.~~

~~P. spica tereti, involucellis bifloris lanceolato-pilosis, seminibus nervosis.~~

Panicum glaucum Pollin. fl. ver. t. 3. p. 208

floret Julio, augusto.

Genus in hortis et vineis vulgatiss. ⊙

Galeopsis Ladanum Linn. Sp. 810.

G. internodiis caulinis aequalibus, verticillis omnibus remotis, calycinis dentibus subulatis aristatis patulis, caule subpubescente.

Flor. junio julio.

Habitat in alveo del Bisagno

Galeopsis Ladanum Linn.

a Sessione del frutto transversale
b Seme, idem, ingrandito.

29

2 Polygonum Convolvulus Linn. Sp. 522.

P. foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusatis Linn.

Flores spurco-albi; antheris violaceis; aestate

In alveo del Bisagno ☉

1 Polygonum Dumetorum.

Flores August. September. in viridis et dumetis ☉

Polygonum fagopyrum?

a. Spica ingrandita
b. al naturale

80

Cyperus longus Linn. sp. 67. Will. sp. 1. p. 285. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 274. Bertol. Pl. Gen. n. 11.

C. radice repente, culmo triquetro, folioso, umbella supradecomposita, 4-6-phylla; spiculis linearibus, alternis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 55. Cipero longo.

Junio, Julio floret.

Gennaj in locis palustribus et aquosis. ♃.

Cyperus longus?

Gnaphalium Stoechas Linn. sp. 1193

G. caule suffruticoso tomentoso, foliis linearibus margine revolutis, floribus corymbosis, corymbo subsimplici terminali, squamis calycinis ovatis.... Corymbus 6-12-florus.

Flor. junio, julio.

In collibus siccis et arenosis. In moeniis maritimis Genuae vulgatissimum. ♄.

1

2

2

Chironia Centaurium Smith. Brit. 1, p. 257. Curt. Lond. fasc. 4. t. 22.

C. caule herbaceo dichotome paniculato, foliis ovato-lanceolatis, calyce tubo breviore.

Gentiana Centaurium. Linn. sp. 332.

Flor. junio ad augustum.

In collibus vulgatissima, ☉.

Clematis recta Linn. Sp. 767.

C. caule erecto, foliis pinnatis, foliolis ovato lanceolatis integerrimis, floribus panicu[latis] terminalibus...

Floret junio, julio.

Habitat. in sylvis, ad ripas fluviorum regionum australium. non Genuæ. 4.

Da rifformarsi

1
2

42 Polygonum Persicaria Linn. sp. 718.

P. floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis...

β. Persicaria mitis cum maculis ferrum equinum referentibus. Tourn. Inst. 509.

Flores rosei, nonnunquam albidi; julio, augusto.

In fossis et locis humidis. ☉

in rifforgi

71 Polygonum Hydropiper Linn.

Fl. Jul. aug. septemb. In rivulis et locis humidis ☉.

Lilium bulbiferum Linn. Sp. 433.

L. foliis sparsis, corollis campanulatis erectis intus scabris.

Flor. junio, julio

Habitat in collibus prope Duos pontes S^ti^ Pantaleoni. ♃

Cucumis Colocynthis. Linn.

Floret Julio

Habitat in alveo del Bisagno prope il ponte della Pila

obs. Planta hispida: odore foetido, moscato.

Cucumis prophetarum? Linn. Syst. veg. 1304

a
b
B
A

[A] Centaurea Cyanus Linn. sp. 1289.

C. caule erecto ramoso, foliis inferioribus pinnatifidis, superioribus linearibus integerrimis, squamis calycinis serrato-subciliatis.

Flores cerulei, interdum violacei, rosei, albi vel etiam variegati.

Floret Julio, augusto, septembri.

~~Non Genuae sub Albaro in cultis prope S.ta Maria~~ ⊙

In messibus, prope Ovada, frequens ⊙. et in alveo del Bisagno rara

Centaurea alba Linn. sp. 1293.

[B] Centaurea amara? Linn. sp. 1293.

C. caule erecto ramoso angulato, foliis lanceolato-oblongis, inferioribus sinuato-dentatis, squamis calycinis interioribus scariosis, exterioribus apice serrato-ciliatis, pappo nullo seminibus margine brevissimo coronatis.

Centaurea nigrescens Ъll. pl. var. t. 2 p. 722.

Floret Julio, augusto.

Genuae sub albaro in cultis prope S.ta Maria - 4. all'acquasola

β. Statice armeria Linn. sp. 394.

S. foliis linearibus planis obtusiusculis, scapo tereti glabro capitato, involucro obtusius=
=culo, calycibus subvillosis.

Armeria vulgaris W. 371, 1.

Flores pallidè rosei; Septembri.

Habitat in sommitate Apennini prope Voltri, loco dicto i Giovi. 4.

Xanthium spinosum Linn. sp. 1400.

X. caule erecto ramoso spinoso, spinis trifurcatis, foliis oblongis (quandoque) trilobis, floribus axillaribus sessilibus solitariis.

Flores subvirides; julio, augusto, septembri

In littore prope voltri, et sestri di ponente. ☉

Serapias triloba Viv. Fl. Ital. Frag. Fasci. 1, p. 11. t. 12. f. 1.

S. bulbis subrotundis, foliis lanceolatis, labello trilobato, lobis omnibus exsertis sub=aequalibus rotundatis crenato-undulatis.

Floret aprili, maio

Habitat in sylvis montosis secus Sturla prope Macagno Genuae. 4.

41

Orchis odoratissima Linn. sp. 1335.

O. foliis canaliculatis, labello obtuse trilobo, petalis lateralibus patentibus, cornu recurvo germen subaequante, bracteis germine longioribus.

O. radicibus palmatis, flore concolore, labello obtuse trifido, calcare germine breviore. Hall. Helv. n. 1274. t. 29.

Fl. junio julio.

Habitat prope duos pontes S. Pantaleoni 4.

obs. odore Caryophylli

Orchis Conopsea

Orchis pyramidalis Linn. sp. 1332.

O. foliis oblongis, spica densa oblonga, labello tripartito, laciniis ęqualibus subintegerrimis, cornu filiforme germine longiore.

Flor. majo, junio.

In pratis, et collibus ubique 4.

Obs. Spica junior conferta, lata conica, subumbellata, convexa; adulta cylindrica, scap. ped. cubit. fere totus tectus fol. convolutis, acutis brevioribus, sępe purpurascentibus. Corol. raro alba; nectar. lab. bicorni.

A
B

A. Genista germanica Linn. sp. 999.

G. spinis verrucoso-compositis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis hirsutis, racemis terminalibus nudis carina pubescente.

Flor. junio, julio.

In collibus prope S. Bernardini. ♄.

B. Hypochaeris uniflora All.

fl. ~~aug.~~ april. maj. all'acquasta 1831.

7.1.

~~minor~~ Decand f. 2

Briza media ~~Linn. sp.~~ 103. Willd. sp. 1. p. 404. Allion. Fl. Ped. 2. p. 248. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 48. Decand. Syn. pl. n. 1626. Bert. ~~Fl. Gen.~~ amoen. p. 331.

B. ligula brevissima, panicula erecta, spiculis ovatis, septemfloris, calyce flosculis minori Poll. Fl. Ver. t. 1. p. 114. Briza Mezzana.

Maj. Jun. floret

Genuae in collibus prope St. Bartolomei vulgatissim. 4. Decand. ☉.

Pessima

Briza minor

non. arist.

Triticum repens Linn. sp. 128. Willd. sp. 1. p. 481. Allion. fl. Ped. t. 2. p. 257.

T. radice repente, foliis planis, spica disticha, spiculis 4-8-floris, calyce, valvulaque corollina exteriori acuminatis, muticis aristatisve.. Poll. fl. ver. t. 1. p. 128.. Frumento strisciante.

Spica virens vel glaucescens; Jun. Jul.

Frequens vulgatissimum in viis campestri. 4.

Radices virtute diuretica, deobstruente instructae in vitiis hepatis et lienis maxime commendantur. L. c.

Ital. Gramigna, grano canino.

Poa dura Poll. fl. ver. t. 1. p. 104. Cynosurus durus Linn. sp. 105

Crocus vernus Linn. sp. 50. Variet. β. = Willd. sp. 1. p. 195. All. fl. Ped. t. 1. p. 84.
C. bulbo laevi, foliis linearibus, planis, linea alba notatis, stygmate trifido, erecto, perigoniis breviore. Poll. fl. veron. t. 1. p. 46.

Flor. primo vere et Febr.

Secus aqueductum dello Zerbino prope S.tum Pantaleonem 4.

Lamium amplexicaule Linn. Sp. 809. All. Fl. Ped. tom. prim. p. 29.

L. foliis radicalibus petiolatis cordatis lobatis, floralibus sessilibus amplexicaulibus inciso-crenatis obtusis. Poll. Flor. Veron. t. 2. p. 273.

Morsus gallinae, folio hederulae, alterum. Lob. Ic. 463. f. 2.

Flores rosei. A veris initio in aestatem. In hortorum areis, inque agrorum marginibus totius Italiae copiose. ⊙.

mal disegnata, e colorita

Ranunculus fluviatilis: caule natante, foliis omnibus capillaceo-multifidis, petalis obovatis calyce majoribus, seminibus glabris. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 242.

Ranunculus aquatilis δ. Linn. sp. pl. 782.

R. fluviatilis. Willd. sp. 2. p. 1335.

R. peucedanifolius Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 53. – Flor. Gall. t. 1. p. 334.

Habitat in ~~aquis~~ fluviis, rivulis, et aquis lente fluentibus: flores albi, medio lutei. Martio. April. Loco dicto. il Sciorro prope la Foce 4.

incompleta

Primula veris Willd. sp. 1. p. 800.

P. foliis rugoso-dentatis, limbo corollarum concavo, dentibus calycinis obtusiusculis, floribus nutantibus. Loiseleur. Fl. Gall. t. 1. p. 113. ... Primula veris officinalis. Lin. sp. p.

P. officinalis. Poll. Fl. Veron. t. 1. p. 226. All. Fl. Ped. t. 1. p. 91.

Flores sulphurei circa faucem crocei. Martio. april. prope il Lagazzo, Marassi, Camaldoli; ~~etc.~~ ♃.

Adam



a.a Capsola ascellara sessile

1 Callitriche verna Linn. sp. p. 6. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 233.
C. foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. Linn... Callitriche vernale.
Flores dilute flavi; martio, aprili.
Habitat in aquis stagnantibus, fossis, rivulis; frequens alla porta Vila. ☉

2 Callitriche verna
flores aestate —

51

Equisetum fluviatile Linn. sp. 1517. All. Fl. Ped. N°. 2383. Decand. syn. pl. N°. 1455.

E. caule sterili folioso, foliis numerosissimis verticillatis, caule fructifero aphyllo, vaginis approximatis fuscis laciniato-dentatis, spica terminali oblonga. Fl. Gall. t. 2. p. [illegible]

Floret martii

In fossis prope portam pila. 4.

f. 1.

f. 2.

1. Cheiranthus incanus. Linn. sp. 924. Willd. sp. 3. p. 520. Bertol. pl. gen. p. 79. Poll. fl. ver. t. 2. p. 3..
C. caule suffruticoso ramoso, foliis lanceolato-oblongis integerrimis obtusis incanis, siliquis compressis apice truncatis. Lois. fl. gal. p. 413. .... Viola alba et purpurea Lob. Ic. 329.
Flores purpurei vel violacei, interdum albi. martio, aprili.
In moeniis maritimis prope la Cava ♄.

2. Cheiranthus cheiri Linn. sp. 924.

Flores Aprili. Maj.
In vetustis moeniis all' aquasola, Porta arco ♃.

1\. Cneorum tricoccon Linn. sp. 49. All. Fl. Ped. t. 1. p. 234.

C. foliis sessilibus oblongis integerrimis .... Lois. Fl. Gall. p 24.

Flor. martio: april. maio.

In saxosis sterilibusque regionum australium crescit. Genua all' acquasola.

2.

Lunaria annua Linn. sp. 911. Willd. sp. 3. p. 477

L. foliis imis oppositis summis alternis cordatis, dentatis dentibus submuticis, siliculis utrinque obtusis. All. Fl. ped. t. 2. p. 352. ... Lunaria annua.

Aprili floret in hortis
Genuae prope Carignano. O. F.

A

B

[A] Scilla Italica Linn. sp. 442.

S. racemo conico oblongo. Linn. mant. 364.

Flore martii aprili.

In collibus Genuensib. . marassi . St Bernard.

obs. Bulbus solidus, parvus.

B]. Euphorbia ~~verrucosa~~ Dulcis Linn. sp. 658. Willd. sp. 2. p. 915. allion. fl. ped. t. prim. p. 287.

~~E. umbella quinquefida; sub-trifida; bifida, involucellis ovatis, caule basi ramoso patulo, foliis lanceolatis serrulatis pubescentibus, capsulis glabris verrucosis. All. fl. ped. t. 2. p. 105.~~

· Euforbia verrucosa.

Martii, aprili floret

In collibus Genuensib. ubique.

Genista ovata Valdst. Pl. Hung.

G. foliis oblongo-ovatis leguminibusque hirsutis, ramis teretibus striatis. Will. sp. 3, p. 94

Flor. junio, julio.

In collibus prope S^t. Bernardini, et secus aquęductum dello Zerbino. ♄.

Melitis Melissophyllum Linn. Sp. 832.

M. caule simplicissimo erecto hirsuto, foliis ovatis crenatis petiolatis subhirsutis, floribus axillaribus solitariis subternisve, corollę labio superiore integro.

Herba sacra quorundam Dalech. Hist. 1336.

Flor. maio, junio.

In collibus et rivulis; al Lagazzo, marassi. 4.

Anchusa italica Willd. enum. pl. 178. Decand. Syn. pl. n. 2729. Bertol. amoen. p. 239.

A. foliis oblongo-lanceolatis, hirtis, racemis conjugatis secundis, floribus distantibus, calycibus quinquepartitis, fauce corollae barbata. Poll. Fl. Ver. t. 1. p. 216. Anchusa italica..

Flores coerulei, fauce barbata alba. april. maj. Jun. inter segetes praesertim nei Spalti prope Monte Sano 4.

anchusa paniculata Spreng. t. 1. p. 560

A. fiora non ancora sbucciato dalla spata
B. petalo staminifero
C uno dei tre petali esterni veduto internamente

59

Iris Sisyrinchium Vit. summ. pl. t. 1. p. 111.

I. imberbi. Foliis linearibus, undulatis, reflexis: scapo multifloro.

Genuæ april. maj. Floret sub moeniis prope S.t Benigno. ♃.

Moraea Sisyrinchium Spreng. t. 1. p. 163.

Vicia Hybrida Linn. sp. 1037. Will. sp. 3. p. 1107. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 325. Bert. pl. gen. n. 202.

V. floribus sessilibus, vexillo villoso, leguminibus pilosis pentaspermis reflexis, foliolis ovato-oblongis retusis mucronatis, stipulis integris Lois. Fl. Gall. p. 462.

Ob. Foliola parva, obovata, retusa, pilis adspersa. Stipul. non fuscae, sed virides Fl. flavi, supra subgrisei, pilosi; april. mai. Habitat in collibus secus aqueductum dello Zerbino et prope terralba ex adverso St. Tecla ☉

Evonymus latifolius. Jacqu. austr. 3. p. 48. Willd. sp. 1. p. 1131. Allion. Fl. Ped. 2. p

E. foliis ovato-oblongis, acuminatis, subserratis, pedunculis filiformi-teretibus multifloris, floribus pentandris, capsulis pentagonis alatis. Pol. Fl. ver. t. 1. p. 301.

E. europaeus β latifolius Linn. sp. 286.

Flores ex viridi rubentes April. maj. in sylvis montosis. ♄.

In editioribus montibus Liguriae All. Fl. Ped.. prope Montebbio

B. Papaver ~~Rhoeas Linn. sp. 726.~~ somniferum Linn. sp. 726.

P. caule multifloro hispido, pilis omnibus patentibus. Foliis pinnatifidis incisis, capsulis glabris obovatis, stigmate decemradiato Poll. Fl. ver. t. 2. p. 172. .. Papavero Rosolaccio.

aprili; maio floret

Genuae prope Carignano in arvis, et cultis. ⊙

63

A. flosculo ingrandito

1. Papaver hibridum Willd. sp. 2. p. 1144. Linn. sp. 725. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 291. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 309.
P. caule folioso multifloro, foliis bi-tripinnatifidis, laciniis angustis, calycibus pilosis, capsulis obovato-globosis, sulcato-torosis, hispidis. Poll. Fl. veron. t. 2. p. 171.
Flores apri. maj.
In canali prope sepulcretum alla Foce ☉

2. Crepis Scabra Will.
Flores april. maj. all'acquasola 1831.

Medicago maculata Willd. sp. 3. p. 1412. Decand. syn. pl. n. 3919.

M. caulibus diffusis, foliolis obcordatis maculatis, stipulis dentatis, pedunculis 2-4-floris. leguminibus cochleatis utrinque compressis aculeis subulatis arcuatis. Poll. fl. ver. t. 2. p. 540.
M. arabica Allion. Fl. ped. t. 1. p. 315. M. polymorpha α Linn. sp. 1098.
Flores lutei Apr. Maj. Jun. ad Portam Vila vulgatissima. ☉.

Pessima

65

Muscari Comosum Willd. enum. p. 378. Decand. Syn. pl. n. 1928.

M. corollis cylindraceis angulatis longe pedunculatis; summis sterilibus longius pedicellatis. Poll. fl. veron. t. 1. p. 446. .. Muscari chiomoso.

Hyacinthus Comosus Linn. sp. 455. Willd. sp. 2. p. 169. Allion. fl. ped. t. 1. p. 118. Bert. pl. gen. n. 112.

Floret april. maj.

In collibus circa Genuam passim. ♃

Obs. Hyacinthus racemosus Icon. tab. 49. pertinet ad hoc genus.

f. 1
f. 2

f. 2 Medicago luppulina. Linn. sp. 1097. Willd. sp. 3. p. 1406. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 314. Decand. syn. pl. n. 39

M. Caulibus procumbentibus, foliolis obovatis, apice subdentatis, spicis ovalibus, leguminibus reniformibus corrugatis monospermis. Vil. fl. ver. t. 2. p. 539. ... Medicago luppulina.

Flores vere et aestate

In pratis, pascuis, et ad vias. ♂.

Cattivo esemplare

f. 1 Medicago P. Scutellata

fl. april. maj. prope lve Strega ad vias ☉

Trifolium stellatum. Linn. sp. 1083. Will. sp. 3. p. 1375. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 305. Bertol. pl. gen.

T. Caule diffuso, foliis obcordatis, capitulis globosis, dentibus calycinis triangularibus patentibus nervosis, corolla longioribus. Poll. fl. veron. t. 2. p. 507.

Floret maj. jun.

Genuæ in moeniis passim ⊙

A
B
α

A Trifolium ~~agrarium~~ Linn. sp. 1088. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 308. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 487.

T. Caule ascendente, foliolis obcordatis denticulatis, stipulis semiovatis acutis, capitulis hemisphaericis, demum ovalibus, vexillis obsolete sulcatis. Poll. fl. ver. t. 2. p. 518.

Trifoglio procumbente....

Flores aurei; maio, junio et aestate.

Genuae prope portam Pilae. ☉

Trifolium scabrum Linn. Allion. fl. Pedem. p. 306. I.

a calice [illegible] veduto colla lente

Iris foetidissima Linn. sp. 57. Will. sp. 1. p. 232. Decand. Syn. pl. n. 1994. Lois. fl. Gall. t. 1. p.
I. imberbis, caule uniangulato, multifloro, foliis ensiformibus. Bll. fl. ver. t. 1. p. 49. .. Iride f.
=sima – Iris foetida Vit. summ. pl. t. 1. p. 110.

maio; junio. floret.

Habitat

4.

Phyladelphus Coronarius Linn. sp. 671. Willd. sp. 2. p. 927. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 294.

P. foliis oppositis, ovatis subdentatis, acutis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 117. .. Filadelfo Coronario.

Ital. Fior angiolo, Salinda.

Flores odori. Majo. Jun.

Exoticae originis nunc frequenter occurrit ad sepes in Monteferrato. Allion. in hortis culta. ♄.

71



Lemna minor Linn. sp. 1376. Willd. sp. 4. p. 194. Lois. fl. gall. t. 2. p. 624. Decand. Syn. plan. n. 1469.

A L. foliis ellipticis utrinque planis basi cohaerentibus, radicibus solitariis. W. l. c.

Lenticula palustris vulgaris Vaill. Bot. paris. t. 20. f. 3.

Floret maio, junio

Genuae in aquis quietis ⊙

non spiegare abbastanza la pianta

Hyosciamus albus Linn. sp. 257. Willd. sp. 1. p. 1011. Allon. fl. ped. t. 1. p. 104. Bertol. pl. gen. n.o 78.

H. foliis petiolatis, sinuatis, obtusis, floribus sessilibus Linn. l. c. Josciamo bianco. Poll. fl. ver. t. 1. p. 24

Majo. Junio. Julio. floret

Genuæ in moeniis maritimis, et in littore alla Foce ☉.

10

Dictamnus albus

1 ~~Dictamus~~ albus. Linn. sp. 548. Matth. p. 744. Willd. sp. 2. p. 541. Allion. Fl. Ped. 2. p. 106. Bert. pl. Gen. p. 6

D. Caule simplici; foliis imparipinnatis, foliolis ellipticis, denticulatis, floribus racemosis terminalibus

. Poll. fl. ver. t. 2. p. 6. .. Dittamo bianco

Majo Juni: floret

Genuæ in collibus al Lagazzo et secus aquaeductum alle morine. ♄.

obs. Radix odore ambrosiaco, sapore amaro subaromatico.

2. Ruta chalepensis

fl. Junio. augst. prope St. Nazzaro et quessi

Campanula Rapunculus. Linn. sp. 232.. Will. sp. 1. p. 896. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 109.

C. foliis undulatis, pilosis, radicalibus lanceolato-ovatibus, caulinis lineari-lanceolatis; panicula coarctata, calycis (quinquefidi) laciniis lineari-subulatis. Poll. Fl. veron. t. 1. p. 272.. Campanola Raponcolo. – Ital. Raponcolo, Raponzolo, Raponzo, Raperonzolo.

Majo. Jun. floret

In collibus ubique. ♂. – Radix in acetariis edulis.

Ital. Raponcolo, Raponzolo, Raponzo, Raperonzolo. Genovese Ramponzo

75

Phalaris aquatica Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 717. (non Linn.)

P. radice bulbosa, panicula mutica coarctata spiciformis ovato-oblonga, glumis calycinis navicularibus subdenticulatis, corolla trivalvi, valvulis interioribus villosis acutis calyce dimidio brevioribus, exteriore subulata minutissima vix conspicua Lois. l. c.

Phalaris aquatica minor Bert. pl. Gen. n. 13. P. Retz. obs. 3. p. 8. W. enum. p. 83.

majo Jun. flor.

Genuae in canali prope il prado ad portam Pila et Lagaccio ♃.

Rhamnus Alaternus Linn. sp. 281. Willd. sp. 1. p. 1101. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 130.

R. inermis ramosissimus foliis ovatis, ellipticisque, serratis, glabris (lucidis), sempervirentibus, floribus polygamis. Poll. Fl. veron. t. 1. p. 289. .. Ramno alaterno. – Ital. Alaterno.

Flores luteo-virides; februario. martio.

Genuae in collibus al Lagasso, et secus aquaeductum dello Zerbino; frequens in ruderatis, et muris.

Lotus siliquosus. Linn. sp. 1089. Willd. sp. 3. p. 1389. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 309.
Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 487. Decand. Syn. pl. n. 3930.

L. caulibus procumbentibus villosis, foliolis cuneiformi-obovatis subpubescentibus, leguminibus solitariis membranaceo-quadrangulis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 534... Loto Li=gnoso...

Flores luteoli cum striis rubris. Majo et aestate

Genuae in locis umidis, praesertim prope Terralba 4.

Lotus siliquosus Linn. sp. 1089.

F 2

78

a bractea monophylla multifida ....
A calyx. bivalvis 2-florus ....
b petiolus ....

F. 1 Cynosurus aureus Linn. sp. 107. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 241.
C. paniculae spiculis sterilibus pendulis ternatis, floribus aristatis. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 53.
Chrysurus cynosuroides. Pers. syn. 1. p. 80. — Lamarckia aurea Decand. syn. fl. n. 1537.
Locis sterilibus mari proximis. Genuae in moenis alla Darsena ☉. Bertoloni.
Flores maio et aestate, in tectis vulgar. sul ponte di Carignano

F. 2. Cynosurus Echinatus. L.

Fl. Iuni.

Lonicera Periclymenum Linn. sp. 247. Willd. sp. 1. p. 984. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 127.

L. foliis ovatis, acutiusculis, glabris, petiolis connatis, florum ringentium, capitulis ovatis, terminalibus. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 284. .. Lonicera Periclimeno.

Maj. Jun. floret.

In collibus. ♄.


f. 1.
f. 2

α Trifolium officinale: leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto Bert. pl. Gen. n. 212. Var.

an? Melilotus officinalis Willd. enum. pl. 790. ~~Lois. fl. Gall.~~ Bertol. pl. Gen. n. 212.

M. Caule erecto, foliolis ovato-oblongis obtusis dentatis, racemis folio duplo longioribus, Calyce superne gibboso, carina alisque vexillum aequantibus, leguminibus nudis dispermis ovatis subcompressis subrugosis acutis. Poll. fl. veron. t. 2. p. 304.

Meliloto officinale

Melilotus officinalis a. allion. fl. Ped. t. 1. p. 308.

Trifolium Melilotus officinalis a. Linn. sp. 1078.

Trifolium officinale Willd. sp. 3 p. 1355. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 479

---

flores lutei; interdum albi; majo junio. julio

In aggeribus agrorum et inter segetes vulgatissim. praesertim ad portam Pila. S.

obs. Herba cum floribus odore gravi fragranti; sapore acri amarulo.

Ital. ~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~, Trifoglio cavallino, Trifoglio odorato.

officin. Melilotus

β. Melilotus parviflora. Bertol. amoen. p. 177. Desf. atlant. 2. p. 192.

M. Caule erecto, foliolis obtusis serratis basi attenuatis, leguminibus monospermis subrugosis ovatis reflexis. Bert. l. c.

Trifolium Indicum Willd. sp. 3. p. 1353. var. d. ~~All. fl. Ped.~~

Melilotus Indica all. fl. Ped. t. 1. p. 308.

Trifolium officinale Bertol. pl. gen. n. 212.

Ital. Dispegnato

f. 2 Melilotus officinalis

Ophrys antropophora Linn. sp. 1343.

O. bulbis subrotundis, foliis lanceolato-oblongis, labello lineari-trifido germine longiore, lacinia media elongata bifida, petalis conniventibus.

Flores luteo-albidi, labello flavescente; maio. Jun.

Habitat in collibus. S.t Tecla. S.t Martino. Marcassi E. 4.

Holcus lanatus Linn. sp. 1485. Bertol. fl. Gen. n. 296.

H. panicula ramosa laxa, glumis bifloris villosis, flosculo hermaphrodito mutico, masculo aristato, arista recurva flore multo breviori Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 689.

Majo Junio floret

Genuae ubique locis gramineis. 4 . spongiis.

2

I

~~Scorzonera laciniata?~~ Linn. 1114. Vill. Jurisd. pl. t. 4 p. 381. Lois. fl. Gall. t. 2 p. 308

~~H~~ Hieracium cymosum Linn. sp. 1126

~~Hieracium~~

Rolyss umbellata Bert. Ravio Ligur. plant. Decas 1 p. 133

~~Podospermum laciniatum~~ Decand. Syn. pl. n° 2984.

majo junio floret

Genuae prope S. Martino ad viam publicam

2 Hieracium Lanceolatum?. Vill.

flores april. majo. sub moenis ad Portam Pila

Dorycnium suffruticosum Vill. Dauph. 3. p. 416. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 490. Decand. synop. fl. n. 3940.

D. foliolis lineari-lanceolatis, calycibus dentibus acutis, caule fruticoso. ... Doricnio fruticoso...

Dorycnium monspeliense Willd. sp. 3. p. 1396. – Lotus Dorycnium Linn. sp. 1093.

Dorycnium... Allion. fl. Ped. t. 1. p. 311. Haller. t. 1. n. 384.

flores albi, carina atropurpurea. majo, junio, julio.

Habitat in locis siccis sterilibus. sull'acquidotti, marazzi, guazzi. G. ♄.

f. 1.
f. 2.

Hypericum Androsaemum Linn. sp. 1102. Willd. sp. 3, p. 1446. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 496.

H. caule fruticoso ancipiti, foliis ovatis integerrimis, floribus trigynis, calycinis laciniis ovatis inaequalibus, capsulis baccatis. Poll. fl. ver. t. 2. p. 547... Iperico androsemo.

Androsemum officinale Allion. fl. ped. t. 2. p. 47.

Majo. junio. floret

In canalibus frequens. alle Morine, Voltri; Polcevera E. ♄.

Italiano. Androsemo – offic. Androsaemum.

male dissegnato

Hypericum montanum L.

Fl. Junio prope il Sassello.

Ophrys apifera Bertol. pl. Gen. n. 276.

O. bulbis subrotundis; scapo folioso; labio convexo, trilobo, lobis lateralibus triquetris, verticalibus medio emarginato; apendicula terminali deorsum flexa. idem.

Flor. april. mai.

Genuae in collibus. vulgatissim. 4.

Ophrys ovata Linn. sp. 1340.

O. bulbis fibrosis, caule bifolio, foliis ovatis oppositis, labello bifido petalis obtusis triplo longiore. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 610.

Epipactis ovata Allion. Fl. Ped. n. 1850. Decand. Syn. pl. n. 2044.

Maio, junio floret

Genuae in sylvis [illegible] umbrosis subhumidis habitat. al monte, Lagaccio. S. Pantaleon Garbo &c. 4.

Orchis Conopsea Linn. sp. 1335. Decand. syn. pl. n. 2024. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 607 All. Fl. Ped. n. 18

O. bulbis palmatis, nectarii cornu longissimo setaceo, labello obtuse trifido, petalis duobus patentissimis.

Flores purpurascentes, interdum dilutiores vel prorsus albi maio. junio.

in locis collinis et paludosis habitat; praesertim prope D^m. Pantaleonem secu- aqueductum. 4.



A



B

Linum catharticum Linn. sp. 401. Willd. sp. 1. p. 1541. Allion. fl. Ped. t. 2. p. 109.

L. caule superne dichotomo, foliis oppositis, elliptico-lanceolatis, obtusis, laciniis calycinis petalisque acutis.. Poll. fl. Veron. t. 1. p. 414. .... Lino catartico.

Petala alba ungue luteo; Maj. Jun. floret

Genuę in collibus prope S.ta Tecla, secus aquęductum, E. ☉

Danthonia provincialis Decand. Syn. pl. n. 1544.

D. arista longa tortili, glumis 5. 6. floris, foliis glabris ore pilosis, inferioribus convoluto-setaceis. D. l. c.

Avena spicata? Vit. Summ. pl. t. 1. p. 225. Avena calycina Lois. fl. Gall. t. 1. p. 65.

Majo, junio floret

Genuę in collibus prope Portam S.ti Bernardini et montibus prope S. Granarolo intus moenia.

Convolvulus sepium Linn. sp. 218. Willd. sp. 1. p. 844. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 107.

C. Caule volubili; foliis sagittatis, lobis truncatis, pedunculis subtetragonis unifloris, bracteis cordatis acutis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 238. ... Convolvolo delle siepi.

Convolvulus major albus. offic.

Flores candidi; maj. et aestate. In sepibus et vepretis: ☉

Obs. Succus herbae inspissatus vi drastica Scamonium aemulat. Dosis gr. XX-XXX.

91

Leersia oryzoides Willd. sp. 1. p. 325 Poll. Fl. ver. t. 1. p. 92

Leersia oryzoides. Willd. sp. 1. p. 325. Decand. Syn. pl. 1494.
L. panicula diffusa, glumis carina ciliatis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 92.
Homalocenchrus oryzoides All. Fl. Ped. t. 2. p. 232.
Phalaris oryzoides Linn. sp. 81.
Poa palustris Linn. sp. 98. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 50.
Jun. Jul. Flor.
Genuae in canalibus. 4.

male expressa

Agrostis verticillata

Lathyrus pratensis Linn. sp. 1033. Willd. sp. 3. p. 1089. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 331.

L. caulibus acutangulis, cirrhis diphyllis simplicibus, foliolis lanceolatis trinerviis, stipulis sagittatis acuminatis pedunculis multifloris. Poll. Fl. veron. t. 2. p. 487. .. Latiro pratajuolo.

Flores lutei, vexillo saepe nigro notato. maj. et aestate

Habitat.

· 4 ·

Sium nodiflorum Linn. sp. p. 361. Willd. sp. 1. p. 1432. Allion. fl. Ped. t. 2. p. 27. Bert. pl. Gen. p. 95.

S. caule procumbente foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis, aequaliter serratis, umbellis subsessilibus oppositifoliis. Poll. fl. ver. t. 1. p. 365. Sio nodifloro.

Flores albi, involucro universali nullo. Maj. Jun. Jul.

Crescit in ~~fossis~~ palustribus sub albaro, bisagno, ♃. 4.

Melica nutans L.

Avena

Genuę prope S.ti Nazari. sub albaro. maj. Jun. floret.

Melica

Thalictrum minus. Linn. sp. 769. Willd. sp. 2. p. 1297. Allion. Fl. Ped. 1. p. 295. Bert. pl. gen. p. 70

T. foliis tripinnatis subrotundis, basi subcuneatis, apice dentatis, obtusis, subtus glaucis, floribus laxe paniculatis cernuis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 209. .. Talittro minore

Majo Junio floret

In collibus Liguslicis. Bertol. prope portam Inzechiappe vulgatiss. 4.

δ Anthyllis V. hirsuta flore ochroleuco?

Anthyllis Vulneraria Linn. sp. 1012. Willd. sp. 3. p. 1013. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 312.

A. caulibus decumbentibus herbaceis, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato. All. Fl. ...

Maio Junio floret

Genuae in collibus prope lo Sperone vulgatiss. 4.

~~Juncus obtusiflorus? Poll. Fl. ver. t. 1. p. 473~~

Salvia pratensis Linn. sp. 35. Will. sp. 1. p. 135. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 14.

S. foliis cordato-oblongis, crenatis, summis amplexicaulibus, acutis; verticillis subnudis, Corollae galea viscosa. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 29. ... Salvia pratajuola.

Ital. Salvia selvatica.

Majo Juni. Jul. floret

Genuz in collibus prope lo Sperone 4.

obs. Planta odore fragranti

Luzula lutea Willd. enum. p. 394. Decand. syn. pl. n. 1823.

L. foliis fistulosis planis vaginisque glaberrimis, spicis subrotundis pedunculatis laxiusculis subcorymb., sepalis inaequalibus oblongiusculis nitentibus Poll. Fl. ver. t. 1. p. 468.

Juncus luteus Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 216... Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 211.

Juncus campestris ε. Linn. sp. 469.

Flores lutei splendentes; Jun. Jul. in collibus prope lo Zerbino uliginosis.

Juncus articulatus.



Capsulis obtectis calycis sinibus reflexis

Campanula Medium Linn. sp. 236. Willd. sp. 1. p. 908. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 113.

C. caule subsimplici erecto, hispido, foliis sessilibus lanceolatis, obtuse serratis, floribus erectis, stygmatibus quinque, capsula 5-loculari calycis decafidi laciniis alternis obtecta. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 279. .. Campanula Medio.

Jun. Jul. flor.

Genuae in collibus vulgatissima. ♂. Colitur in hortis ob floris praestantiam.

Ital. Campanula grande, Medio, Viola maura

Hyosciamus niger Linn. sp. p. 257. Willd. sp. 1. p. 1010. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 103. Lois. fl. Gall. t. 1. p. 134.
Decand. Syn. pl. N° 2683. Pollin. fl. veron. t. 1. p. 240.

H. foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus sessilibus. Linn. Josciamo nero.

Abunde locis pinguibus ruderatis, et suburbanis. Pedemon. Allion. Maj. Jun. Jul. Floret. ⊙. ♂.

Ital. Giusquiamo, Josciamo nero, Dente cavallino.

Hyoscyami folia, et rarius semina offic.

Tamarix Gallica Linn. sp. 386 Willd. sp. 1. p. 1498. All. Fl. Ped. t. 2. p. 87.

T. floribus pentandris Linn.

Flores albo-rosei; majo, junio, julio.

Genuae in agro Nicaeensi All. Fl. Ped. – ad ripas fluviorum, in locis humidis Lois. Fl. Gall.

prope Savona

Festuca phleoides Bert. rarior. ligur. plant. decad.

alopecurus gerardi? Linn. allion. et
~~Festuca phleoides~~ Vill. Dauph.
alopecurus ciliatus? all. Ft Ped. n. 2150.

Coronilla Securidaca Linn. sp. 1048. Willd. sp. 3. p. 1153. All. fl. Ped. t. 1. p. 335. Poll. fl. Veron. t. 2. p. 528.

C. caule herbaceo erecto, foliolis cuneato-oblongis, floribus umbellatis pedunculatis, leguminibus compressis falcatis.

Securigera Coronilla Decand. Syn. pl. n. 4051.

Maj. Jun. Jul. flor.

Genuae in collibus prope S. Zerbino ☉.

Coronilla Securidaca Linn. sp. 1048. Securigera Coronilla Decand. Syn. pl. n. 4051.

Rubus fruticosus Linn. sp. 707 Willd. sp. 2 p. 1084. Allion. fl. ped. t. 2. p. 132. Lois. fl. Gall. t. 1. p. 298.

R. caulibus fruticosis angulatis, petiolisque aculeatis subtus cano-tomentosis, foliolis petio-
=latis. Poll. fl. veron. t. 2. p. 149.

Ital. Rovo, Rogo di macchia – Genov. Moje.

Flores albi vel incarnati. A majo in autumnum. In sepibus et dumetis ubique. ♄.

Bromus asper Linn. suppl. p. 111 Willd. sp. 1. p. 432. Vitm. summ. pl. t. 1. p. 214. Decand. syn. pl. n. 1636.

63. Foliis scabris vaginisque villosis, panicula laxa, nutante, subsecunda, spiculis tere=
=tiusculis, pubescentibus, flosculis demum remotiusculis, aristis rectis gluma brevioribus.
Boll. fl. ver. t. 1. p. 133. Bromo aspro.

Spiculae virides vel ~~ex~~ viridi purpurascentes; Iun. Iul. Genuae in sepibus et nemo=
=rosis. ♃.

~~Bromus sterilis~~?

Bromus asperus.



Gnaphalium minimum Smith Fl. Brit. 873

Junio Julio flore.

Genuæ in saxosis vulgatissim. 4.

Gnaphalium Leontopodium

107

Scabiosa gramuntia Linn. sp. 143. Willd. sp. 1. p. 551. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 140. Bert. amoen.

S. corollulis quinquefidis, calycibus brevissimis, foliis caulinis bipinnatis filiformibus. Lin.
Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 78.

Scabiosa columbaria β. Pollin. Fl. ver. t. 1. p. 154.

Genuę in collibus passim 4. cum Scabiosa columbaria

obs. calyculus plicatus, margine extenso.

Ononis antiquorum Linn. sp. 1006. Willd. sp. 3. p. 988. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 316. Bert. am. p. 171.

O. caule pubescente, ramulis demum spinescentibus, foliis inferioribus ternatis, superioribus simplicibus, foliolis ellipticis obtusis, apice serrulatis, floribus solitariis Bert. amoen. loc. cit.

O. foetens Bertol. pl. Gen. n. 198.

Jun. Jul. flor.

Genuae sub lo Sperone extra moenia. 4.

Matricaria Chamomilla Linn. sp. 1256. Willd. sp. 3 p. 2161. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 192.

M. caule ramoso, foliis bipinnatis setaceis, squamis calycinis obtusiusculis. Poll. Fl. Ver. t. 2. p. 660.

Majo et aestate flor.

Genuae in collibus prope Portam S.t Bartolomei. ⊙ et alveo del Bisagno vulgatissima

Ital. Camomilla, Camamilla, Antemide. Offic. Chamomillae flores.

41

42

2 Medicago falcata Linn. sp. 1096. Willd. sp. 3. p. 1405. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 314. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 492. Decand. Syn. pl. n. 3900

M. caulibus ascendentibus, foliolis oblongis apice dentatis, pedunculis racemosis, leguminibus contorto-falcatis glabriusculis. Poll. Fl. Ver. t. 2. p. 538. ... Medica falcata

Flores flavi. Majo et aestate

Genuæ. in collibus prope lo Zerbino, [redacted] 4.

mal dipignate

Medicago falcata?

Scrophularia aquatica Linn. sp. 864. Willd. sp. 3. p. 270 Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 68.

S. caule erecto alato, foliis oppositis cordato-ovatis obtusis crenatis, petiolis decurrentibus, racemis terminalibus. Poll. Fl. Ver. t. 2. p. 325.

Junio et aestate floret.

Genuae juxta rivulos et fossas: praesertim ad portam Pila &c.

Obs. Folia odore debili foetido, sapore amaro. Sennae addita in infuso, saporem ejus nauseosum corrigunt.

Scrophularia Balbisii

Capparis spinosa Linn. sp. 720. Willd. sp. 2. p. 1130. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 293.

C. foliis subrotundis obtusis glabris, stipulis spinosis, pedunculis unifloris solitariis, capsulis ovalibus. Poll. Fl. veron. t. 2. p. 177.

Flores Junio Julio incarnati vel coerulescentes formosi

Genuae in moeniis. ad vetustos muros. E. ♄.

male disegnati

Agrostemma Coronaria Linn. sp. 625. Willd. sp. 2. p. 805. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 86.

A. tomentosa, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis elongatis unifloris, petalis emarginatis coronatis serratis.. Att. Fl. ver. t. 2. p. 82. .. Agostemma Coronaria

Flores purpurei vel albi. Junio et aestate

In sylvis cæduis Pedemontii, allionius .. ♂. in hortis colitur.

Incomplete

Melica Ciliata Linn. sp. 97. Willd. sp. 1. p. 381. All. Fl. Ped. t. 2. p. 254. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 47. Durand. Syn. n. 1541.

M. panicula subspicata, coarctata, aequalis, spiculis erectis, 2-3-floris, flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. Poll. Fl. Ver. t. 1. p. 97. ... Melica Cigliata

M. C. (Perigonio extus villoso) panicula spiciformi elongata perigoniis ciliato-villosissimis. Durand. Syn. pl. n. 1541.

Flor. Majo, Junio.

Locis montanis alpestribus apricis saepissime occurrit. Allion. l. c. ♃. all'acquasol. inven.

et cratto

Trifolium montanum Linn. sp. 1087. Willd. sp. 3. p. 1381. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 307. Bert. pl. gen. n. 216.

T. caule erecto, foliosis utrinque lanceolatis serrulatis, stipulis aristatis, capitulis rotundo-ovatis, dentibus subaequalibus monospermis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 517. .. Trifolio Montano.

Genue ai Camaldoli Bertol. l. c. praesertim sub albaro. 4 . prope il Rubado

obs. Flores albi. Jun. Juli. Calyx glaber, aut vix pubescens, dentibus subaequalibus. Foliola exacte lanceolata, utrinque acuta, serrulata. Caulis erectus, conspersus pilis adpressis incanis ut inferior foliorum pagina.

Carpinus Betulus Linn. sp. 1416. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 188. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 661. Decand. Syn. pl. nº. 2112.

C. foliis ovato-lanceolatis duplicato dentatis; amentis masculis lateralibus, femineis laxis terminalibus, squamis fructus 3-lobis ampliatis. Lois. Fl. Gall.

Floret aprili majo. Jun.

Genuæ in collibus prope Marassi, monte, sub albaro &c. ♄.

male dipegnate

Osthya vulgaris

Poa fluitans Willd. Enum. p. 103. Bertol. pl. Gen. n. 25. Decand. Syn. p. n. 1600.

P. radice repente, panicula elongata, erecta, spiculis linearibus adpressis, sub 10-floris, flosculis obtusis, liberis, septemnerviis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 103. ... Poa galleggiante.

Festuca fluitans Linn. sp. 111. Willd. sp. 1. p. 426. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 255. Lois. Fl. t. 1. p. 54.

Spiculae viridulae; a Majo in autumnum.

Genuae in rivulis lente fluentibus, ad Portam Pila vulgatiss. ♃.



Glyceria fluitans R. Br.

Allium sphaerocephalon Linn. sp. 426. Willd. sp. 2. p. 70. Allion. fl. Ped. t. 2. p. 156. Polling. veron. t. 1. p. 431. Lois. fl. Gall. t. 1. p. 194. Decand. Syn. pl. n. 1975.

A. caule teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspidatis, corollâ longioribus. Bertol. plan. Gen. p. 49.

Flor. Jun. Juli.

Genuæ copiose sub lo Sperone et [illegible]. moeniis. 4.

~~Nobis~~ Decand

Briza minor. ~~Linn sp. 102~~. Willd. sp. 1. p. 403. Allion. fl. ped. t. 2. p. 247. Lois. fl. Gall. t. 1. p. 48.

B. Ligula longissima, panicula erecta, basi folio superiore involuta, spiculis triangula=
ribus 5-7-floris, calyce flosculis majori. Poll. fl. ver. t. 1. p. 113. Briza minore

Briza virens? Decand. Synop. plant. N°. 1627.

Majo-Junio floret

Genuae in locis arenosis. Secus torrentem del Bisagno prope il rabaldo. ⊙

Trifolium angustifolium Linn. sp. 1083. Will. sp. 3. p. 1372. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 305. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 484. Decand. Syn. pl. n. 3878.

T. caule erecto, foliolis lineari-lanceolatis, acutis, stipulis acuminato-aristatis ciliatis, capitulo elongato conico, dentibus hirsutis, inferiore longitudine corollae. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 512. ... Trifolio angustifolio.

Flores incarnati, Junio Julio.

Genuae sub moeniis prope <u>lo Zerbino</u>, et alveo <u>del Bisagno</u> ☉

Campanula Speculum Linn. sp. 238. Willd. sp. 1. p. 912. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 114.

C. caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis subcrenatis, floribus solitariis, laciniis caly-
=cinis corollam rotatam aequantibus, capsulis prismaticis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 282. - Cam-
=panula specchio. ... Prismatocarpus Speculum Decand. Syn. pl. N. 2856.

Flor. Jun. Jul. violacei, raro albi.

Genuae inter segetes, et alveo del Bisagno vulgatissima ⊙.

Ital. Specchio di Venere, Billeri rossi.

Campanula Ibrida

fig. dextera et C. falcata

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scleranthus annuus. Linn. sp. 580. Willd. sp. 2. p. 660. All. Fl. Ped. t. 2 p. 193.

S. caulibus patentibus calycibus fructus patulis acutis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 18.

Junio floret

Genuae in alveo <u>del Bisagno</u> prope <u>il Rubaldo</u> ☉

Reseda Luteola Linn. sp. 643. Willd. sp. 2. p. 876. Allion. Fl. Ped. 2. p. 91.

R. caule erecto virgato, foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis Bll. Fl. ver. t. 2. p. 95... Reseda Luteola

Flores Jun. Jul.

Genuae in alveo del Bisagno prope sepulcretum della Foce ⊙

Ital. Bietolina, Guaderella, Erba guada, Luteola.

Alopecurus agrestis. Linn. sp. 89. Willd. sp. 1. p. 357. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 234. Decand. Syn. pl. n. 1477. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 40.

A. Culmo erecto, superne scabriusculo, panicula spicata, cylindracea, acuta, glumis calycinis ultra medium connatis, acutis, nudiusculis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 68.

Panicula viridi albida, vel violacea, ante florescentiam saepe rubescens; majo et aestate.

Genuae inventus ad portam Pila ♃.

Ital. codolina, Erba codina. —

Trifolium arvense Linn. Sp. 1083. Willd. Sp. 3. p. 1373. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 305.

Tr. caule diffuso, foliolis lanceolato-linearibus, capitulis villosissimis oblongis mollibus, den=
=tibus calycinis corolla longioribus Poll. Fl. ver. t. 2. p. 506. Trifoglio arvense.

Flores albidi vel rosei. Jun. Jul. J.

Genuae inter segetes: praesertim prope il Bubaldo alla Foce ⊙

Fedia olitoria Willd. Enum. p. 52.

F. caule glabro, foliis oblongis, obtusis, subintegerrimis, fructu obsolete tridentato. Poll. Fl. veron. t. 1. p. 44.

Valeriana Locusta α. Linn. sp. 47.

Valerianella olitoria Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 24. Decand. Syn. pl. n. 3330.

Valeriana olitoria. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 4. Willd. sp. 1. p. 182.

Flores coerulescentes; aprili, majo.

Genius in arvis et inter segetes. ⊙

Ital: Gallinelle, Cecerello.

Usus. Herba tenella in acetariis gratum palato cibum praebet.

Veronica Beccabunga Linn. sp. 16. Willd. sp. 1. p. 64. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 75.

V. caule inferne radicante, foliis petiolatis ellipticis, obtusis, serratis, racemis axil=laribus oppositis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 17.

Flores coerulei vel coeruleo-purpurascentes; a Majo ad autumnum. ad scaturigines, fossas, aquas stagnantes. vulgatissima prope portam Vila. ♃

Usus. uti Veronica Anagallis.

Ital. Beccabunga.

Lapsana communis. Linn. sp. 1141. Willd. sp. 3. p. 1624. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 206.

L. caule striato ramoso, foliis imis petiolatis ovatis angulato-dentatis lyratisque, superioribus ovato-lanceolatis acutis, calycibus fructus angulatis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 603.

Maj. Jun. Jul. Floret.

Genuae in saxosis, et prope Carignano in hortis. ⊙

129

2

1\. *Circaea lutetiana* Linn. sp. 12. Willd. sp. 1. p. 53. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 233.

C. caule erecto, pubescente, foliis ovatis, acutis, subdentatis. Bert. Fl. ver. t. 1. p. 32.
... Circea parigina ....

Flores rosei, quandoque prorsus albi; Jul. aug. In umbrosis locis – in prato prope paludem Brudo prope Lavagna vulgatissima.

Genuæ. a Bel vedere ♃.

2\. Esemplare portatomi dal Dottore Dellacella Chirurgo all'Ospedale di Pammatone, che disse esser quell'erba con cui un paesano guarì un Cancro incipiente in un contadino che inutilmente era stato nell'ospedale sudetto alcuni mesi = facendone degli empiastri con pistarla e porla sopra

130

Serapias rubra Linn. mant. 490.

S. foliis lanceolato-oblongis amplexicaulibus, bracteis germine longioribus, floribus erectis, labello acuto lineis elevatis undulato.. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 614.

Epipactis rubra All. Fl. Ped. t. 2. p. 153. Decand. Syn. pl. n. 2042.

Jun. Jul. floret

Genuae prope Bel vedere ♃.

Obs. Scap. ped-cubit. et ultra, alterne flexuosus, subhirsutus, inferne purpura-violaceo. Fol. infer. min. quandoq. ovata, sensim crescentia. Fl. magni, purpur. vel rosei.

Sedum album Linn. Sp. 619. Willd. sp. 2. p. 766. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 122. tab. 65. f. 2.

S. glabrum, foliis sparsis, cilindricis, oblongis, obtusis patentibus, floribus paniculato-corymbosis. Poll. Fl. veron. t. 2. p. 72. ... Sedo bianco. ... Sempreviva minore Matt. p. 1176.

Petala alba; antherae atro-purpureae. Jun. Jul.

Genuae in muris, tectis, et rupibus valde frequens. ♃. vulgatissim. prope S.t Tecla

Rosa alba Linn. sp. 705. Willd. sp. 2. p. 1078. Allion. fl. ped. t. 2. p. 139. Decand. syn. pl. n. 3717. Poll. fl. veron. t. 2. p. 147.

R. germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque pubescentibus aculeatis, foliolis glabris, calycinis laciniis pinnatifidis. Lois. fl. Gall. t. 1. p. 297.

Rosa Sepium Lois. fl. Gall. t. 1. p. 296.

Flores albi odori. Jun. Jul.

Gennz in collibus prope S. Tecla, Rusciaten, E. Marassi, Morine. ♄

Physalis alkekengi Linn. sp. p. 262. Willd. sp. 1. p. 1022. Allion. Fl. Ped. T. 1. p. 126.

P. caule herbaceo, inferne subramoso, foliis geminatis ovatis, subrepandis, integerrimis, acutis. Poll. Fl. veron. t. 1. p. 259.

Flores albidi; Jun. Jul.; calyx fructus coccineus.

Crescit in sepibus umbrosis q. praesertim in collibus di Quessi. ☉.

obs. Fructus sive baccae sapore acidulo. Planta, odore viroso.

Prunella grandiflora. Willd. sp. 3. p. 177. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 34.

P. caule ascendente, foliis petiolatis, oblongo-ovatis, basi dentatis, calycis labio superiore trifido Poll. Fl. ver. t. 2. p. 301.

Prunella vulgaris grandiflora β. Linn. sp. 837. Bertol. pl. gen. n. 164.

Brunella grandiflora Decand. Syn. pl. n. 2607.

Flores coerulei vel purpurei vel rosei vel albi. A junio in autumnum.

Genuae in collibus ubique. ♃.

Prunella Laciniata Linn. sp. 837. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 35.

P. caule hirsuto basi prostrato, foliis radicalibus ovato-oblongis, superioribus pinnatifidis, corollis calyce vix duplo majoribus. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 364.

P. grandiflora B. Willd. sp. 3. p. 177.

β P. Grandiflora laciniata Poll. Fl. veron. t. 2. p. 301.

P. vulgaris laciniata γ. Linn. sp. pl. ed. 1.

Flores albi aliquando rosei, raro coerulei vel purpurei. A Junio in autumnum.

Senus in collibus vulgatissima. ♃.

Ajuga chamaepitys. Willd. sp. 3. p. 10. Decand. Syn. pl. n. 2495.

A. Caule diffuso villoso, foliis radicalibus spathulatis subdentatis caulinis trifidis, floribus axillaribus solitariis, folio brevioribus. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 265.

Teucrium chamaepitys. Linn. sp. 787. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 340.

Bugula chamaepitys allion. Fl. Ped. t. 1. p. 46.

Chamaepitys. Matt. p. 865. et officinal.

Flores luteis ab Aprili in aestatem fere totam floret.

Habitat in locis aridis et sabulosis (in Brjagno) praesertim collinis copiose reperitur. ☉ Ital. Iva artetica. e Genovese

Vir. Amara et aromatica planta Arthritica vel Arthetica vulgo vocata, cum arthritidi et podragre atonicae medeatur. Praeterea menses movere putatur.

137

I. Bractea foliacea
2. Gluma viste colla lente

Cynosurus cristatus Linn. sp. 105. Willd. sp. 1. p. 411. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 241.
Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 53. Decand. Syn. pl. n. 1645.

C. foliis linearibus, panicula spicata, lineari, bracteis pinnato-distichis, muticis.
Poll. Fl. ver. t. 1. p. 140.

Spica viridis, antheris primum aurantiacis demum violaceis; Maj. Jun.

Genuae in collibus prope Serralba ♃.

Teucrium Botrys. Linn. sp. 786. Willd. sp. 3 p. 14. Allion. Fl. Ped. t. 1. f. 41.

T. Caule ramosissimo, foliis multifidis, verticillis dimidiatis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 239.

..Teucrio Botri..

Iun. Iul. floret.

Gignitur in collibus prope i Camaldoli ⊙

obs. odor leviter Scordii

Coronilla Varia Linn. sp. 1048. Willd. sp. 3. p. 1153. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 335.

C. herbacea diffusa, foliolis plurimis ellipticis mucronulatis glabris, leguminibus teretibus torosis erectis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 527.

– Flores purpurei vel Coerulei aut variegati, carina atro rubens. Maj. Jun. Jul.

Genuae in collibus prope S. Bernardini, et alveo del Bisagno al Chiappasso. ☉ prope Lagrigliam vulgatiss.

Teucrium Scorodonia Linn. sp. 789. Willd. sp. 3. p. 24 Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 44.
Pollini Fl. veron. t. 2. p. 260.

T. foliis cordatis rugosis crenatis petiolatis, racemis secundis terminalibus laterali=
=busque, calycis labio superiori subrotundo caule erecto.. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 342.
.. Teucrio Scorodonia....

Flores luteoli; antheris rubris. Jun. Jul.

Genuæ in alveo <u>del Bisagno</u> prope <u>le Morine</u> ♃.

Odor Scordii, vires similes suadet, ait Allionius.

f 1

f 2

J. 1. Juncus effusus Linn sp. 464. Willd. sp. 2. p. 205. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 214.

J. culmo nudo stricto molli, panicula laterali supradecomposita effusa, capsulis clavatis apice truncatis Poll. Fl. ver. t. 1. p. 470.

Jun. Jul. floret

In uliginosis. 4.

S 2 Thlaspi Campestre Poll.

fl. April. maj all'acquajola 1831

Lilium Martagon Linn. sp. 435. Willd. sp. 2. p. 88. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 160

L. foliis verticillatis, ovato-lanceolatis, floribus reflexis, perigoniis revolutis.
Poll. Fl. ver. t. 1. p. 461. -- Giglio Martagone.

Jun. Jul. floret.

Genuae loco dicto <u>acqua fredda</u> prope Montobbio. ♃.

I

2

143

a fiore intero ingrandito
b calice idem
c petalo idem

71. Cochlearia Coronopus. Linn. sp. 904. Willd. sp. 3. p. 450 Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 397.
vit. Summ. pl. t. 4. p. 22.
C. caule ramoso prostrato, foliis pinnatifidis, laciniis integris, dentatis, incisisve, racemis oppositifoliis, siliculis reniformibus compressis, valvis dorso cristato-rugosis. Poll. Fl. Veron. t. 2. p. 366.

Coronopus Ruellii. All. Fl. Ped. t. 1. p. 256.

Senebiera Coronopus. Dec. syst. nat. 2. p. 525. Coronopus vulgaris. id. syn. pl. t. 4239.

Carara Caesalp. pl. p. 370.

Ambrosia Matt. valg. p. 899.

Flores albi minimi. Maj. Jun. Jul.

Genuae in arenosis prope Sepulcretum della Foce ☉. Vill. F.

Vitman. l. c. descript. Caul. multi; vix dodrant. ramosi. Fol. laete virentia, crassiuscula, glabra; 2-3. juga, impari extremo. Racemi laterali brevissimi pauciflori. Fl. conferti; subsessil. petala alba. Silicul. echinatae, cristatae.

72. Alyssum maritimum

In moeniis maritimis, all'acquasola prope Dinegro

Floret tota hyeme. 4.

Teucrium chamaedrys. Linn. sp. 790. Willd. sp. 3. p. 28. allion. fl. Ped. t. 1. p. 32.
T. caulibus villosis sub-procumbentibus, foliis petiolatis cuneiformi-ovatis, inciso-dentatis, floribus subternis. Poll. fl. ver. t. 2. p. 261... Teucrio Camedrio.
Flores purpurascentes, raro albidi. Jun. Jul. Aug.
Frequens ad sepes apricas tum in planitie tum in collibus. 4.
Herba aromatica amara plurimum valet contra febres intermittentes

Herniaria hirsuta Linn. sp. 317. Willd. sp. 1. p. 1297. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 209.

H. caule patulo villoso, foliis ciliatis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 330.

H. caulibus duriusculis ramosissimis prostrato-repentibus hirsutis, florum glomerulis axillaribus paucifloris hirsutis. Decand. Syn. pl. n. 2293.

Flores herbacei; Jun. Jul.

Genue prope Maraggi in arenosis. ☉

I
2

1. *Sedum saxatile* Decand. fl. Gall. 3624. Willd. sp. 2, p. 765.

2. *Cichorium intybus*

~~Sedum atratum? Linn~~

F.1
F. 2
F. 3

Veronica Anagallis Linn. sp. 16. Willd. sp. 1. p. 65. Allion. Fl. Ped. t. 1. f. 76.

V. caule erecto, foliis sessilibus, oblongo-lanceolatis, serratis, racemis axil-
-laribus, oppositis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 16. Veronica anagallide.

Flores dilute coerulei cum venis saturationib. a Majo in Septembrem.

Genus in fossis, rivulis et paludibus locis. 4.

Ital. Beccabunga, Crescione f.

Usus. Succus expressus prodest in scorbuto solus vel cum lactis sero bibitus.

Veronica chamaedrys

Veronica officinalis L.

Scrophularia canina Linn. sp. 865. Willd. sp. 3. p. 277. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 69.

S. foliis oppositis ternatisve pinnatis, pinnis incisis, pinnatifidisve dentatis, racemo terminali nudo, pedunculis bifidis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 326.

.. Variat caule glabro, et caule pubescente ... Scrofolaria canina ...

Ob. Folia modo opposita modo terna, magis minusve incisa et laciniata.

Flores atro-purpurei, raro albidi. A Junio in autumnum.

Crescit in locis siccis sterilibus – in [illegible] moeniis ubique ⊙ Poll. 4 Lois. ego.

Antirrhinum Spurium Linn. sp. 851. Willd. sp. 3. p. 235. allion. Fl. Ped. t. 1. p. 65.
A. villosum, caulibus procumbentibus, foliis ovato-subrotundis, inferioribus oppositis petiolatis, superioribus alternis subsessilibus, floribus axillaribus longe pedunculatis. Poll. Fl. veron. t. 2. p. 333. Antirrino spurio.
Linaria Spurium Decand. Syn. pl. n. 2637.
Flores lutei, galea violacea vel atro-purpurea. aug. sept.
Genuae in litore alla Foce. ☉

13.

Allium Descendens? Linn. sp. 427. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 194.
Allium sphaerocephalon β.
A. Staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis (caule,) umbella sphaerica non bulbifera spatha bivalvis
Flores rubri, linea media longitudinali viridi in unaquaque perigonii lacinia.
Jun. Jul.
Genus Cum allium sphaerocephalon.

Allium sphaerocephalon L.

151

Heliotropium europaeum Linn. sp. 187. Willd. sp. 1. p. 741. Allion. Fl. ped. t. 1. f. 53.

H. caule herbaceo, erecto, foliis ovatis, ~~integer.~~ integerrimis, tomentosis, rugosis, spicis conjugatis. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 204.. Eliotropio europeo.

Flores pallide caerulei vel albidi; aestate.

Genus in agris praesertim in Bisagno vulgatiss. ☉

Ital. et officin. Verrucaria.

Sisymbrium amphibium. Linn. sp. 917. Willd. sp. 3. p. 491. Decand. Syn. pl. fr. 4151.

S. Radice fibrosa, caule erecto striato, foliis oblongo-lanceolatis serratis pinnatifidisve, petalis calyce majoribus, siliquis ellipticis declinatis. .. Poll. fl. ver. t. 2. p. 411 ... Sisembro anfibio.

Brachiolobos amphibius Allion. fl. Ped. t. 1. p. 278.

Nasturtium amphibium Decand. Syst. nat. 2. p. 196.

Petala flava, calyce duplo longiora. apr. Maj. Jun.

Genuae in locis umidis, et ubi aquae stagnarunt frequens et prope Sepulcretum della Foce vulgatiss. 4.

153

Bignonia Catalpa Linn. sp. 868. Willd. sp. 3. p. 289.

Bi. caule arboreo, foliis simplicibus ternis oppositisque cordatis acutis integerrimis, floribus paniculatis terminalibus. Poll. Fl. veron. t. 2. p. 330.
Bignonia catalpa...

Flores pallide incarnati suaveolentes, staminibus plerumque duobus et interdum quinque. Jun. Jul. Habitat in Japone et Carolina sed ubique educatur [redacted] ♄.

Virt. Siliquae commendantur in asthmate convulsivo.

Ital. Catalpa...

male dipignt

F.1

F.2

F 3

F 4

a fiore ingrandito, con due stami al di fuori
b fiore parimente ingrandito, e chiuso
c foglia al naturale Seme carnoso
d detto ingrandito da cui si vedono
pert. farinosi dei quali ne sono ....

Linaria minor. antirrhinum Linn.

Chenopodium album β

Euphrasia lutea L.

Hyssopus officinalis

Teucrium Marum Linn. sp. 786. Willd. 649, 6.

T. foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis, subtus tomentosis, floribus racemosis secundis. Poll. fl. ver. t. 2. p. 259.

Flor. aestate.

Genuae colitur vulgo in hortis ob singularem herbae fragantiam. ♄

Herba oleo volatili instructa, odore camphorato, sapore acri amaro, commendatur uti antispasmodica. Z.

Ital. Maro, Maro d'Egitto - Genovese. maro.

Marum verum vel Syriacum offic. —

β Centaurea paniculata Linn. sp. 1289. Willd. sp. 3. p. 2292. All. Fl. Ped. t. 1. p. 159.
Bert. pl. Gen. n.o 263.
C. caule paniculato, foliis inferioribus bipinnatifidis, superioribus pinnati=fidis, calycibus ciliatis ovatis adpressis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 725. Centaurea pannocchiata ....

Flores purpurei vel carnei, squamis calycinis quandoque vix ciliatis, et fere nudis. Bert. amg.

~~[illegible]~~

Genuae locis maritimis praesertim prope Sturla; quarto E. 4.

Ferula nodiflora Linn. sp. 356. Willd. sp. 1. p. 1413. Allion. fl. Ped. t. 2. p. 5.

F. foliis tripinnatis, foliolis linearibus angustissimis basi appendiculatis, umbellis ad nodos verticillatis pedunculatis, terminali subsessili. Poll. fl. veron. t. 1. p. 370. .. Ferula nodiflora...

Ferula sulcata Bert. pl. Gen. n. 94.

Flores lutei. Jul. aug.

Ubique in montibus Genuensibus supra Oreggina usque ad Diamante. 4.

male

Holcus halepensis L.

Jul. augt. Flor.
Genuæ. prope portam Pila.



Holcus halepensis

Origanum vulgare Linn. sp. 824. Willd. sp. 3. p. 135. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 21. Bert. pl. gen. n. 162. Matt. p. 739.

O. caule subsimplici, foliis breviter petiolatis, ovatis, integerrimis, sub=pilosis, spicis subrotundis paniculatis glomeratis glabris, involucris ovatis coloratis calyce longioribus. Poll. fl. ver. t. 2. p. 302. ... Origano vulgare ...

Flores purpurascentes, aliquando bracteis rubris. Jun. Jul. aug.

Frequens inter vepres et aggeres, praesertim in collibus vulgatiss. 4.

Obs. Herba oleo volatili referta, odore fragranti grato, sapore aromatico, amarulo subacri.

Ital.° Origano, Regamo. Genovese Cornabüggia.

Potentilla reptans Linn. sp. 714. Willd. sp. 2. p. 1108. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 57.

P. caule repente, foliis quinatis obovatis serratis, pilosiusculis, pedunculis axillaribus unifloris.. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 163.

Flores lutei. a Majo in autumnum

Genuit in pascuis et aggeribus vulgatiss. praesertim ad portam Pila 4.

Pentaphyllum seu Quinquefolium offic.

Ital. Cinquefolio.

Virt. Radix et herba stypticae adstringentes in nimio mensium fluxo, et ad alvum solutum sistendum commendantur, nec non ad febres intermittentes fugandas.

Centaurea solstitialis Linn. sp. 1279. Willd. sp. 3. p. 2309. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 162.
Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 597.

C. foliis decurrentibus tomentosis lineari-lanceolatis integerrimis, radicalibus lyrato-pinnatifidis, floribus solitariis terminalibus, calycibus duplicato-spinosis.
Poll. Fl. veron. t. 2. p. 729. .... Centaurea solstizialis

Ital. Ceceprete.

Jul. aug. Flor.

Genuae prope il Bisagno ☉

melan

Centaurea solstitialis Linn.

Thymus Nepeta Willd. enum. pl. 624. Decand. Syn. pl. n. 2598. Bert. amoen. p. 160. idem pl. Gen. n. 163.

T. caule subhirsuto, foliis ovatis obtusis serratis glabriusculis, pedunculis axillaribus multifloris dichotomis, dentibus inferioribus calycis superioribus vix longioribus, villis faucis prominentibus. Ucr. fl. ver. t. 2. p. 294. .. Timo Nepeta ..

Melissa Nepeta Linn. sp. 828. Willd. sp. 3. p. 147. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 38. ~~[illegible]~~. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 362.

Flores purpurascentes vel albi Jul. aug.

Ubique in collibus. 4.

Obs. Distinguitur a Melissa Calamintha Linn. racemis inferioribus folio valde ~~minoribus foli~~ longioribus, foliis et floribus minoribus, odore Menthae pulegii; in reliquis convenit. Bert. loc. citat.

163

A Laguerman

1. Trifolium resupinatum Linn. sp. 1086. All. Fl. Ped. t. 1. p. 307. Decand. Syn. pl. n. 3887.

T. caulibus erectis prostratisve, foliolis ovatis, capitulis subrotundis axillaribus pedunculatis, calycibus fructiferis inflatis membranaceis pubescentibus bidentatis, corollis resupinatis. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 486.

Maj. Jul. floret

In arvis, et pratis macilentis, tum secus vias Genuae. ⊙ ~~[illegible]~~.

2. Trifolium vesiculosum – fragiferum

Maj. Jul. flor.

In arvis et pratis

Trifolium resupinatum?

Lavatera punctata

Sol.

Genuae Saeng agro propa Quinto.

cattiva esemplare

Althaea cravbonensis? Jacq. Ic. Rar. I. t. 138. Cavan. Diss. 2. p. 94. t. 29. f. 2

Hedysarum Coronarium Linn. sp. 1058. Willd. sp. 3. p. 1209. Allion. fl. Pd. t. 1. p. 323.
H. caulescens diffusum, foliis pinnatis foliolis ovatis, racemis axillaribus, legu=
=minibus aculeatis nudis rectis. Pll. fl. ver. t. 2. p. 524. Edisaro Coronario.

Ital. Sulla, Erba sulla, Lupinella selvatica.

Jun. Jul. floret

Genuae prope Quarto loco dicto la Bagnera [redacted]

Hedysarum Coronarium? Linn.

Inula odora Linn. sp. 1236. Decand. Syn. pl. n. 3143. Willd. sp. 3. p. 2089. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 677.

I. caule simplici superne villoso paucifloro, foliis dentatis hirsutissimis, radicalibus ovato-oblongis petiolatis, caulinis lanceolatis amplexicaulibus. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 372.

Jul. aug. floret.

Genuae in collibus, alle morine prope quarto. ♃

Calyx imbricatus, receptaculum nudum. Flores radiati ligulis numerosis [illegible]. Antherae [illegible]
[illegible] pappus simplex pilosus
Inula odora

167

A n.° 1 stame coll'antera veduta colla lente
B. Parti della generazione veduta al naturale

Arbutus Unedo Linn. sp. 566. Willd. sp. 2. p. 616. All. Fl. Ped. t. 1. p. 135. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 237.

A. Caule arboreo, foliis ovato-oblongis, obtuse serratis, panicula terminali, baccis polyspermis. Bert. Fl. Pedron. t. 2. p. 16.

Flores albi purpurascentes. Sept. oct.

Genuæ in collibus ubique. ♄.

Ital. arbuto, albatro, corbezzolo, rossello. Genovese armusin.

Betonica stricta Willd. sp. 3. p. 94. Bertol. amoen. p. 159. Poll. fl. ver. t. 2. p. 269.
Lois. fl. Gall. t. 2. p. 354.

B. spica oblonga, corollarum galea integra, lacinia intermedia labii inferioris crenato-undulata, calycibus pilosis. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 354.

B. officinalis. Bert. pl. Gen. n. 160.

Flores purpurei, nonnunquam albi; Junio.

Secus Leira a Voltri Bertoloni. loc. cit. Segnus aqueduct. et prope quarto. ego. 4.

2.p.269.

Verbena officinalis Linn. sp. 29. Willd. sp. 3. p. 120. enum. p. 635. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 26. Bert. pl. Gen. n. 3.

V. caule erecto, foliis multifido-dentatis, spicis filiformibus paniculatis. Poll. Fl. veron. t. 2. p. 288

Flores coerulei vel albo-purpurascentes, raro albidi. Jul. aug. sept.

In viis campestribus. 4. Bertol. loc. cit. ☉.

Herba inodora, leviter adstringens, et amarula.

Ital. Verbena, Erba S. Giovanni. = Genovese Erba minza, o minsäea.

Nerium Oleander Linn. sp. 305. Willd. sp. 1. p. 1234 Allion. fl. ped. t. 1. p. 101.

N. foliis lineari-lanceolatis, ternis, subtus costatis, laciniis calycinis lanceolatis squamosis, nectariis planis tricuspidatis. Bell. fl. ver. t. 1. p. 253.

Nerio Leandro

Flores rosei, purpurei, et albi; Jul. aug.

Frutex Indiae orientalis oriundus Bll. l. c. In toto Mediterranei Cratere obvium. In Liguria occidentali fluminum ripas pulcherrime obvestit. Nil communis in Corsica, Sardinia, et Sicilia Vivian. Fl. Libicae. p. 14. — ♄

Ital.° Leandro, Oleandro, Alloro indiano, Lauro roseo, Mazza di S.t Giuseppe — Genovese Belladonna. —

Cnicus arvensis. Lois. Fl. Gall. p. 543.

Flores purpurascentes. Jul. aug. Leviter odori flos amigdalis Persic.
Genuæ prope S. Giuliano sub albaro.

pappus plumosus
Cnicus arvensis? Hoffm.

Eupatorium Cannabinum Linn. sp. 1173. Willd. sp. 3. p. 1756. Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 175.
Bertol. pl. Gen. p. 110.

E. foliis petiolatis tripartitis ternatisve, foliolis lanceolatis serratis, intermedio longiore ... Poll. Fl. ver. t. 2. p. 635. .. Eupatorio Canapino.

Folia in feracioribus locis interdum quinquepartita. Flores rubentes vel raro albidi Aug. Sept.

ad margines fossarum vulgatiss. 4.

Virt. Herba intense amara in aqua decocta contra intermittentes febres valet. Radix diuretica et cathartica est.

Momordica Elaterium Linn. sp. 1434. Willd. 1069. All. Fl. Ped. t. 1. p. 122.
Decand. Syn. pl. n. 2823.

M. caule ramoso prostrato, foliis cordatis sublobatis obtuse dentatis scabris, floribus axillaribus pedunculatis, masculis racemosis, foemineis solitariis, pomis ellipticis hispidis. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 665.

Flores luteo-albidi; julio, augusto.

Genuae in locis petrosis prope S.t Giuliano sub albaro. ☉.

Inula dysenterica Linn. sp. 1237. Willd. sp. 3. p. 2091. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 573.
Decand. Syn. pl. n. 3146. Bertol. pl. Gen. n. 254.

I. caule pubescente paniculato, ramis lateralibus apice longioribus patulis, foliis amplexicaulibus cordato-oblongis lanceolatis serratis subtus subto=
=mentosis, calycinis squamis linearibus setaceis. Poll. Fl. Ver. t. 2. p. 674.
Inula disenterica...

Aster dysentericus Allion. Fl. Ped. t. 1. p. 196.

Flores lutei. Jul. aug.

Genus secus aqueductum extra portam dello Zerbino. In palustribus vulgatiss. 4.

Herba odore debili, sapore subacri, olim contra dysenteriã adhibebatur.

f 1

y. ~~fiore~~ fiorellino intero al naturale della fig. I.

175

f 2

a pappo piumoso ingrandito
b ~~fiore~~ intero al naturale
fiosculo

f. 1 ~~Centaurea galactites Linn. sp. 1300. Willd. sp. 3. p. 2327. All. Fl. Ped. t. 1. p. 163.~~

~~C. Calyc. setaceo-spinosis: foliis decurrentibus, pinnatis, spinosis, subtus tomentosis. Vit. Summ. pl. t. 5. p. 148.~~

~~Variat. Caule cubit. simplic. vel ramosus....~~

~~Galactites tomentosa Decand. Syn. pl. n. 3071.~~

~~Cnicus galactites Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 536.~~

~~Flores purpurascentes, interdum albi Julio Aug. Sept.~~

~~Genuis in marginibus agrorum, et secus vias, locis saxosis. Lois. ⊙ Decand. ♃. Vit. ⊙~~

Cnicus Lanceolatus Pollin. fl. ver. t. 2. p. 615. f. 1. 2

f. 2. ~~Carduus pycnocephalus Bertolon. p. gen. p. 148.~~

fl. Jul. aug. Sept. cum Centaurea galactites

3. aa. un ~~Curcubio~~ Insetto in stato di ninfa che si ritrova nei pappi, o nel ricettacolo di questo Cnicus. quale non sembrerebbe quello descritto da Raniero Gerbi, poichè in questo non vi vidi indizio di Galla, ma s'involge nei pappi di questi fiori, ovvero si trova impiantato nel ricettacolo dei detti fiori – il fatto si è che applicato ad un dente cariato, o strisciato leggermente sulla gengiva, o al foro del dente calma i dolori istantaneamente in più di venti casi, mancò quattro volte soltanto, contando due casi di dente non cariato –

bb. l'istesso curcubio ingrandito colla lente. –

si trova ~~[illegible]~~ nei mesi d'agosto, settembre, ottobre, novembre sempre in questo stato. non lo vidi ancora in stato di animale perfetto.

4 L'animale sortito dallo stato di crisalide ingrandito colla lente. Musca cardui?

7. 9 l'istesso animale della grandezza naturale

Ocimum Basilicum Linn. sp. 832. Willd. sp. 3. p. 161. Decand. Syn. pl. n. 2610.

O. Glabrum, caule ramoso, foliis ovatis subserratis concavis, calycibus ciliatis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 298. ... Ocimo Basilico.

O. majus. Matt. val. p. 532.

Flores albi aliquando carnei. Media aestate

Genuae in hortis. ⊙ In India Persia Habitat

Herba fragrans, aromatica; semina mucilaginosa

Officinal. Herba Basilici. Ital. Bassilico, Bassilico maggiore

Genovese Baxaicò.

2
I
I

91 Senecio vulgaris Linn. sp. 1216. Willd. sp. 3. p. 1979. Alli. Fl. Ped. t. 1. p. 199.
Bert. pl. Gen. n. 251.

S. foliis pinnatifido-sinuatis amplexicaulibus dentatis, floribus radio destitutis. sparsis .. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 686.. Senecione Volgare...

Flores lutei. Toto fere anno floret in hortis, arvis, et cultis ubique. ☉

Virt. Herba sapore salso oleraceo forma cataplasmatis adhibetur scopo emolliendi. Ex aqua decocta, pariter ac succus ejus vermes enecant, et vomitum faciunt.

Ital. Senecione, Calderugia, Erba Calderugia, Sollecione. Genov. Selisson.

2 Solidago virgaurea Linn.

Sonchus tenerrimus. Linn. sp. 1117. Willd. sp. 3 p. 1515. All. Fl. Ped. t. 1 p. 223. Sp. Gen. tt. 228. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 509.

S. foliis pinnatifidis bipinnatifidisve basi cordato-sagittatis, pedunculis subtomentosis umbellatis, calycibus pilosis. Bll. Fl. ver. t. 2. p. 600.

.. Sonco tenerello.

Folia polymorpha. Flores lutei Maj. Iun. Iul. et iterum autumno.

Genuæ in moeniis, præcipue maritimis. 4.

malam dipegnate

Carthamus lanatus Linn. sp. 1163. Willd. sp. 3. p. 1707. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 547.

C. Caule superne ramoso, lanuginoso, foliis inferioribus pinnatifidis den=
=tatis, summis amplexicaulibus bracteisque calycinis exterioribus pin=
=natifido-dentatis spinosis.. Bert. Fl. ver. t. 2. p. 608.. Cartamo lanato.

Atractylis lanata All. Fl. Ped. t. 1. p. 154. ... Matt. p. 857.... Dod. Pempt. 736.

Corollulae luteae, radii neutrae. Inven. Jul. Aug.

Genus in locis aridis vulgatissima ⊙

a fiore al naturale
b detto ingrandito
c item aperto idem
d germe idem
E una porzione dei stami ingranditi,
per vederne la configurazione loro.

72 Erica Carnea Linn. sp. 504. Willd. sp. 2. p. 412. Bert. pl. gen. p. 120.

E. antheris bifidis, exsertis; corollis oblongis, collo arctatis; foliis subquaternis; floribus secundis. Bert. l. c.

Erica herbacea β. All. Fl. ver. T. 1. p. 502. Lois. Fl. Gall. tab. 225.

E. coris folio nona Clus. Hist. 44.

Flores purpurascentes aug. sept.

Abundat in orientali plaga Liguriæ in montibus. Bertol. prope <u>il Garbo</u>, et <u>Bel vedere</u> loco dicto <u>la Crocetta</u> ego. ♄

71. Erica vulgaris

fiori in settembre e ottobre

Sopra il monte di Portofino colla precedente

Panicum Crusgalli Linn. sp. 83. Bert. pl. gen. n. 16. All. Fl. Ped. t. 2. p. 240. Decand. Syn. pl. n. 1501.

P. spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 39.

Floret Julio, augusto.

Genuae in agris, et cultis nascitur. ☉



Chara Vulgaris Linn. sp. 1624. Vit. summ. pl. t. v. p. 289. all. fl. Ped. t. 2. p. 221.

C. submersa, caulibus ramosis laevibus, foliis verticillatis latere interiore fructiferis, bracteolis fructu sessili spiraliter striato brevioribus. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 622.

Floret junio julio.

Genus in aquis stagnantibus, et rivulis prope il Forte di Bighiellieu sopra la Costa ⊙. et augusto

Planta foetida. Lati cespites in fundo aquarum facti, caulibus fragilibus, modo crusta subvillosa tectis; modo tuberculis exasperatis, ramosissimis, saepe rubris. Vit. summ. pl. t. v. p. 289.



Asparagus acutifolius Linn. sp. 449. Willd. sp. 2. p. 153. All. Fl. Ped. t. 2. p. 167.

A. Caule inermi angulato fruticoso, foliis aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis aequalibus. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 457. Asparago acutifolio ... Bert. pl. Gen. n. 111.

Flores albo-lutescentes. aug. sept.

Genuae in sepibus. vulgatissim. 4.

Ital. Sparaghella, Asparago selvatico. Genovese Spaëghi Sarvëghi.

Primo vere turiones esitantur, et urinam movent sicut Asparagus officinal.

Mentha aquatica Poll. fl. ver. t. 2. p. 252. Linn. sp. 805. All. fl. Ped. t. 1. p. 18.
Willd. enum. p. 610.

M. foliis ovatis, sub-cordatis, serratis, petiolatis pubescentibus, spicis capitatis, sub-interruptis, calycibus hirsutis, ... Menta aquajola

M. hirsuta Linn. mant. 81. Willd. sp. 3. p. 78. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 17.
Bert. pl. Gen. t. 158.

Flores coeruleo-purpurascentes, staminibus corolla brevioribus.
aug. sept.

Genuae secus torrentem. 4.

obs. Mentha piperita Linn. sp. 805. monente Smith. fl. brit. 2. p. 617. est hujus varietas.

Mentha sylvestris δ. Allion. Fl. ped. t. 2. p. 251. Bert. amoen. p. 158.

M. caule pilis deflexis villoso, foliis sessilibus oblongo-lanceolatis, ~~acutis~~ rotundatis ~~inaequaliter serratis~~ dentatis, canescentibus, subtus tomentosis, spicis cylindraceis, basi interruptis, bracteis subulatis. All. l. c. ... Menta silvestre.

M. rotundifolia Bert. Pl. Gen. n. 157. All. Fl. ped. t. 1. p. 17.

Flores albi, staminibus modo exsertis, modo inclusis. Jul. aug. sept.

Ubique secus aquas, et locis humidis. 4.

Ital. Mentastro. plant. odore aromatico grav.

Carlina vulgaris Linn. sp. 1161. Willd. sp. 3. p. 1696. Alli. Fl. Ped. t. 1. p. 156. Bert. pl. Gen. n. 247. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 546. Decand. Syn. pl. n. 3098.

C. caule multifloro corymboso lanato, foliis lanceolatis dentatis spinosis subtus pubescentibus, bracteis calycinis exterioribus pin=natifidis, interioribus albidis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 610. Carlina vul=gare.

Obs. caulis quandoque unifloro: corollulis centralibus atro-purpureis. Flores sulphurei, radius ex-albo pallidissime. Aug. Sept. Genus in squalidis, asperisque locis vulgatiss. ♂.

Carlina corymbosa



β Melica coerulea Linn. mant. alt. 325. Willd. sp. 1. p. 383. All. Fl. Ped. t. 2. p. 254.
Bert. pl. Gen. n. 23.

M. panicula coarctata, spiculis erectis, cylindricis, petalis acutis, imberbibus.
Poll. Fl. ver. t. 1. p. 98. ... Melica cerulea.

Aira coerulea Linn. sp. 95. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 45.

Spiculae ex viridi et purpureo, vel ex viridi, violaceo purpureoque variae;
Flor. augusto, septembri

~~[illegible]~~:

Genuae. secus aquas et locis humidioribus. 4.

Melica coerulea Linn. sp. 325

Chenopodium Vulvaria Linn. sp. 321. Willd. sp. 1. p. 1305. All. Fl. Ped. t. 2. p. 197.
Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 146.

C. caule diffuso, foliis rhombeo-ovatis, integerrimis, racemis conglomeratis axillaribus terminalibusque. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 326. Chenopodio Vulvaria.

Flores herbacei. Jul. aug. sept. Ottob.

Genus juxta parietes, et ruderatis vulgatiss: ☉ praesertim sopra porta Silva sotto S. Chiara

Herba odore foetido hircino commendatur uti antispasmodica

Offic. Vulvaria

Ital. vulvaria, connina, Erba connina.

male ?

F 1

F 2

Valva annuloque nullis; stipite centrali fistuloso; lamellis nunquam nigrescentibus; pileo haud umbilicato. Decand. Syn. pl. p. 32.

Agaricus (mycena) foraminulosus. Fuscus glaber, pileo campaniformi, senius conico nunquam supra striato, lamellis inequalibus liberis, stipite cylindrico tenui. Decand. Syn. pl. #. 429.

Genus. in prato prope il Rubado. ~~[illegible]~~. autumno.

1 Agaricus (mycena) foraminulosus Zantedes. in Diaro Brugnatelli; e Conf. 1821. p. 105.

2 - Agaricus (coprinus) ferrugineus Lignorum

Ha il gambo appena fistoloso, le lamine disuguali distanti; non attaccate al gambo; quando è giovine rosee, ~~ke~~ invecchiando divengono sempre più oscure — nessuna carne per cui veduto incontro alla luce è trasparente. lo trovai all'acquajola accanto al cornaro ove erano delle foglie in putrefazione, dopo molti giorni di pioggia il 1. di Giugno. Si liquefà in glutine ~~che [illegible]~~ nericcio che applicato alla pelle mi fece sentire, dopo qualche tempo, un piccolo bruciore accompagnato da calore alla parte.

Lepidium iberis Linn. sp. 900. Willd. sp. 3 p. 441. Allion. fl. Ped. t. 1 p. 253. Bert. pl. Gen. p. 76. Lois. fl. Gall. t. 2. p. 394. Decand. syn. pl. n. 4241.

L. glabrum, caule erecto ramoso, foliis radicalibus serratis pinnatifidisve, caeteris linearibus integerrimis, siliculis ovatis acutis. Poll. fl. ver. t. 2. p. 370.

Lepidio Iberide

Flores aug. et autumno.

Genuae ubique in semitis. 4

Briza Eragrostis Linn. sp. 103. Willd. sp. 1. p. 405. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 248. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 48.

B. pilis vaginantibus oppositifoliis, panicula patente pedunculis basi glandulosopubescentibus, spiculis lanceolatis serratis, sub 20-floris, flosculis obtusis.

Poa megastachya Decand. Syn. pl. n. 1598. Poll. Fl. ver. t. 1. p. 106.

Spiculae virides, cinereae, vel purpurascentes; Jul. aug. sept.

Habitat in hortorum areis, agris cultatissim. ⊙

a. flosculi colle sete aristate ingranditi colla lente.
b. semi privati della corolla ed ingranditi colla lente

Panicum verticillatum Linn. sp. 82. All. fl. ped. t. 2. p. Lois. fl. Gall. t. 1. p. 38.

P. spica verticillata racemulis quaternis, involucellis unifloris bisetis, culmis diffusis.

Aestivis mensibus floret

Habitat in arvis et cultis. ☉

Panicum viride Poll. fl. ver. t. 3. p. 209

F. 1.

F. 2.

F. 3.

2 Erigeron canadense Linn. sp. 1210. Willd. sp. 3. p. 1934. All. fl. Ped. t. 1. p. 198.

E. caule floribusque paniculatis hirtis, foliis lanceolatis ciliatis. Linn. ....

Erigero Canadense ....

Florum discus luteolus, radius albido. Sub. Aug. Sept.

Agros omnes Italiæ infestat, vi ventorum propagatum. nam Canada et Virginiae indigenum putatur ☉

71 alyssum paniculatum. Bll. fl. aprili maj. all'acquajole 1831.

73 arabis serpillifolia Bll. fl. aprili prope Divi Bernardini 1831.

Apargia tuberosa Willd. sp. 3. p. 1549. Bert. amoen. p. 182. lucubr. p. 23.

A. radice tuberosa, scapo unifloro nudo glabriusculo, foliis ovato-runcinatis hirtis scabris, pilis furcatis, calycinis squamis acutis hirtis. Poll. fl. ver. t. 2. p. 568.

Picris tuberosa All. fl. ped. n. 763.

Leontodon tuberosum Linn. sp. 1123. Bert. pl. gen. pag. 230. Lois. fl. gall. t. 2. p. 513.

Cichorium Constantinopolitanum Matt. p. 533.

Flores lutei aug. sept. ottob.

Ubique locis herbidis. 4

Mespilus monogyna Willd. enum. p. 524. Allion. fl. ped. t. 2. p. 141.

M. spinosa, foliis ovatis acutis subtrifidis serratis glabris, floribus subcorym=
=bosis monogynis, sepalis lanceolatis acuminatis. Poll. fl. ver. t. 2. p. 132.

Crataegus monogyna Willd. sp. 2. p. 1006.

Crataegus Oxyacantha Bird. acon. 1. p. 166.

acuta spina Matt. p. 181.

Flores albi april. maj. fructificatio sept. octb.

In sepibus et dumetis vulgatiss. ♄.

Amaryllis Lutea. Linn. sp. 420. Allio. fl. Ped. n.2. p. 153. Will. 391, 1.
Lois. fl. Gall. t. 1. p. 192. Decand. Syn. pl. n. 1977.

A. spatha indivisa obtusa, flore sessili; corolla campanulata erecta basi breve-tubulosa, staminibus erectis alternis brevioribus. Will. l.c. Amarillide gialla

Flor. Septem. octob.

Genuę. in collibus. al Lagazzo 4.

.1.

breve-

gialla

Calyx bi-florus ~~[illegible]~~
uno constanter abortivus

Arundo Pseudophragmites Lois. Supp. Fl. Gall. p. 25.

A. panicula diffusa, calycibus acuminatis (biflori), arista dorsali recta pilisque corolla paulo longioribus.

A. phragmites α.

Flor. august. sept.

Genuæ in lacubus: al Lagazzo. ♃

Ital. Canna palustre, Cannuccia, Spazzola di palude. Genovese Canetta.

Colchicum autumnale Linn. sp. 485. Willd. sp. 2. p. 272. All. Fl. Ped. t. 1. p. 117.
Vill. Fl. ver. t. 1. p. 476. Lois. Fl. Gall. t. 1. p. 217.

C. bulbo submultifloro, floribus folia longe praecuntibus, foliis planis lato-lanceolatis. Decand. syn. pln. n. 1897.

Septembri; octobri floret; fructus vere sequenti.

Genuae in collibus ubique. 4.

Radix bulbosa, principio acri instructa, odore graveolente, sapore intense acri nauseoso est narcotica, drastico-cathartica, phthyriaca, diuretica.
Parantur cum radicibus acetum colchicum, syrupus colchicus et oxymel colchicum. Baldenses succo ex floribus et radicibus expresso utuntur ad pediculos enecandos.

Ital. Colchico. Milanese Borzotto. Genovese Zaffran Sarvægo, Cancaxieu.

malos dispegnate

A

B

agaricus (Gymnopus) coccineus

A

[struck through] In collibus Gennensibus vulgatissim. Sept. octobr.

B agaricus glutinosus? Decand. Synops. p. 528

In collibus Sept. octobr.

Obs. pileo et stipite glutinosus.

Hieracium murorum Linn. sp. 1128 Lois. Fl. Gall. t. 2. p.

♃ caule erecto folioso piloso simplici, foliis ovatis basi profunde dentatis,
floribus paniculatis. All. Fl. ver. t. 2. p. 592. Jeracio di muri.

Flores palide lutei Sept. octobri.

Genuae in collinis et montanis locis; ad sepes nelle strade nuove presso St. Martino [redacted] 4.

Hieracium sylvaticum Berth. amaen.

β Centaurea Dalea Poll. fl. ver. t. 2. p. 727.

C. foliis inferioribus lanceolatis subdentatis incisisve, summis line=
=aribus integerrimis. Pol. l. c.

Centaurea amara Linn. sp. 1292. Willd. sp. 3. p. 2303. Allion. fl. Ped. t. 1. p. 160.
Decand. Syn. pl. n. 3036.

Centaurea bracteata Scop. delic. fl. et faun. insubr. p. 17. t. 9. (pl. culta)
Bert. pl. Gen. n. 265.

Obs. Caulis erectus vel decumbens ramosus. Folia mire polymorpha,
modo tomentosa, modo fere glabra, modo omnia lanceolata integerrima,
modo inferiora lanceolata vel sinuato-dentata vel trifida vel fere
pinnatifida, cetera lanceolato-linearia vel linearia integerrima,
modo omnia angustissima linearia integerrima.

Genue. In collibus vulgatissima. August. Sept. oct. 4.

~~Festuca serotina Lin?~~

Sesleria coerulea Seg. fl. ver. t. 1. p. 101.

Flores sept. octobr.

Genuae in collibus vulgatissim.

Raphanus maritimus Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 730. Siliquis articulatis laevibus, articulis unilocularibus, rostro subulato, foliis pinnatifido-lyratis piloso-scabris, radice perenni.

Raphanus Raphanistrum Linn. sp. 953. Lois. Fl. Gall. Decand. syn. fl. n. 4108.

R.: caule ramoso hispido, foliis scabris, siliquis articulatis striatis unilocularibus, 3-8 spermis, stylo longioribus. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 380. – Rafano Rafanistro.

Petala alba, luteola, ~~[illegible]~~ lineis violaceis aut nigris picta, toto anno flor.

Genus in Bisagno vulgatissim. 4

Fontinalis antipyretica? Linn. Syst. veget. p. 795. Vit. Summ. pl. T. 6. p. 153. Dec. Syn. pl. n. 1397.

F. foliis complicato carinatis, trifariis, acutis, capsulis lateralibus. Savi Fl. pis. T. 2. p. 413

Fructificatio: in mensis Januar. Februar.

Genuae in fossis prope Porta Pila loco dicto Ebrera

Iberis semperflorens Linn. sp. 904. Decand. syn. pl. n. 4259. Willd. sp. 3. p. 432.

I. frutescens, foliis cuneatis spathulatisque, obtusis integerrimis glabris, floribus corymbosis, siliculis apice truncato-subemarginatis, lobulis obsoletis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 356. Iberide sempreflorita..

Flores albi odorati. Floret per totam fere annum in hortis, et viridariis culta. ♄.

Italiano Porcellana, Nassi. Genovese Erba neive- I Giardinieri lo chiamano Narassico.

Erica Corsica Decand. Fl. Fr. 2803.

E. antheris aristatis, corollis tubulosis (ovoideis), stylo aequalibus, floribus fascicolato-capitatis, foliis quaternis quinisve ramis sub-tomentosis.
.... Erica corsicana...

Flores sept. ottob. Decembr.

Habitat in Corsica, Geneve in hortis culta. ♄.

Erica Ramulosa Viv. an. Bot. 1. p. II 169. idem Fl. Ital. Fragm. 4. tab. 7. idem Flor. Corsic. Specier. novar. p. 5. ... Habit. in Corsica aust. et regni Neapolit.

Erica stricta Bert. amaenit. p. 25.

Erica Corsica? Decand.

Tussilago fragrans Willd. sp. 3. p. 1969. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 563.

T. foliis subrotundo-cordatis aequaliter denticulatis subtus pubescenti=
=bus, thyrso fastigiato, floribus radiatis. Poll. Fl. ver. t. 2. p. 696.
Tussilagine odorosa...

Flores albo-rubentes. Januario floret in hortis Genuensibus fere omnibus,
ubi ob florum suaveolentiam educatur. Sponte nascitur circa Neapolin.
4. ivi. - Ital. Vainiglia d'inverno.

Narcissus Pseudo-Narcissus. Linn. sp. 414. Willd. sp. 2. p. 35. Allion. Fl. Ped. t. 2. p. 154.

N. spatha uniflora, corona campanulata erecta undulata peri=
=gonii lacinias ovatas aequante... Bot. Fl. ver. t. 1. p. 427....
...Narciso Pseudonarciso...

Flores marti, april. ...

Genuæ in locis collinis vidi prope S^t. Pantaleone 4 ditro al Begato

Stal.° Trombona, Giracapo semplice. Francese narcisse des prés. aiault, Faux narcisse, Porillon.

obs. toutes les espèces de narcisse paraissent posséder la propriété émétique dans leurs bulbes. Les espèces qu'il a essayées, Loiseleur-Deslongchamps, sont la narcisse à bouquets, le narcisse odorant, e le ~~[illegible]~~ à devant désigné. La seconde a donné, comme emetique, les resultats plus satisfaisans, que les deux autres; en employent les oignons sous forme de poudre.

Cheiranthus maritimus Linn. sp. 924 Willd. sp. 3. p. 518. All. Fl. Ped. t. 1. p. 272.

C. Caule scabriusculo basi prostrato superne erecticusculo, foliis elli=
=pticis obtusis nudis scabriusculis, floribus racemosis terminali=
=bus ... Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 413. ... Cheiranto maritimo.

Flores .. april. maio. et tota aestate.

Genua. — in Hortis cult. ⊙

Anagyris foetida Linn. sp. p. 534. Decand. syn. pl. n. 3798. Allion. Fl. ped. t. 1. n. 1264.

A. foliis ternatis subtus incanis, floribus cum carina brevioribus.
anagiri fetida...

Flor. Februario.

Circa Nicaeam ad rupes All. Fl. l. c. ♄.

Iris tuberosa Linn. syst. veget. p. 79. Vit. Summ. pl. t. 1. p. 114. Vivian. Fl. Libic. Spec. p. 3. Lois. Fl. Gall. t. 2. p. 717.

I. corollis imberbibus, foliis tetragonis. Linn. sp. pl. 58.

Flor. martio.

Genuus in collibus prope il Garbo. rara. in hortis culta 4.

A.
B.

A Schoenus nigricans Linn?

B Schoenus ferrugineus

fl. al Lagype.

Plantago psyllium: caule herbaceo; foliis linearibus integris dentatisve, capitulis aphyllis. Bert. pl. gen. p. 34.

Flor. martio. april.

In herbidis prope <u>il Borgo degli Incrociati</u>: ☉

Osserv. questa pianta toccandola lascia le mani con un idea d'attaccaticcio, che presto svanisce, e tramanda un odore grave, balsamico, disgradevole.

Hyoseris radiata: scapis unifloris nudis; foliis glabris lyrato-runcina=
=tis dentatis, lacinia terminali trifida Willd. sp. 3. p. 1612.

H. radiata Linn. sp. p. 1137. Lois. Fl. Gall. t. 2 p. 529.

Rhagadiolus radiatus. All. Fl. Ped. n. 835.

Flores lutei; april. et aestate

Genuae in muris, et locis herbidis vulgatissima. 4

Genovese Zaggiainetto

Tussilago Petasites: foliis hysteranthiis cordatis inaequaliter dentatis subtus pubescentibus, lobis approximatis, thyrso ovato, pedunculis unifloris, floribus discoideis, flosculis omnibus fere hermaphroditicis. Pol. fl. Ver. T. 2. p. 697. ... Tussilagine Petasite....

Flores purpurascentes. mart. april.

Genus locis umidis, et rivulis. al Lagazzo. ♃.

Ital. Petasite, Tussilagine maggiore.

2/5

Calendula arvensis?

Planta sempervirens, et semper florens

Genuz. secus aequaeductum dello Zerbino. prope gli archi nuovi: et moeniis ai spalti sopra il Borgo degli incrociati:

Osservazione. le foglie sono tutte sessili; raramente dentate, un poco carnose, scabre; I rami sono angulati, anch'essi scabri. I flosculi del centro hanno lo stigma capitato. Tutta la pianta è ramosa, e i rami sono procumbenti; tramanda un forte odore aromatico che ha un idea del sudore dell'uomo.

Carex cuspidata: culmo subangoloso; spiculis congestis, terminalibus, distinctis, acuminatis; foliis canaliculatis, strictis. Bert. pl. gen. p. 282.

Mart. april. floret

Copiose in Albaro al Paradiso ante aedes Saluzzo, et Bisagno prope il Rubado. 4.

Cistus Helianthemum

Cistus

Carex flacca: vaginis brevissimis vel nullis, spicis cylindricis, foemineis laxis fructiferis pendulis; capsulis obtuso-ovatis, apice integris. Bert. pl. gen. n. 286.

Martio, aprili, floret

In collibus Genuensibus ubique. 4.

Rhagadiolus edulis: Decand. syn. plant. n. 2878. Willd. sp. 3. p. 1625.

R. seminibus laevibus patentibus, foliis lyratis.

Lapsana Rhagadiolus Linn. sp. 1141.

Fl. majo. Jun.

Habitat prope sepulcretum dei Morti (ora) dappoi in alveo del Bisagno. ☉

male

Asperula arvensis Linn. sp. 150.

Fl. Majo. Jun.

Genuae in alveis del Bisagno prope Sepulcretum dicto dei morti

idem

A
β

BIBLIOTECA

2

BIBLIOTECA CIVICA BERIO GENOVA
m.r.
V
3
26